

2015 április díszhala: az ékfoltos razbóra



Az ékfoltos razbóra azonnal felismerhető az oldalán elhelyezkedő, a faroknyélen elvékonyodó, háromszög alakú, kékesfekete foltjáról. Hátoldalának színe olívaazöld, lentebb ezüstös árnyalatú. Az ivarérett hímek ékfoltjának elülső széle egyenesebb, a hátulsó csúcsa pedig hegyesebb szögbe keskenyedik el; a nőstények eléggé teltek.



Trigonostigma heteromorpha - Ékfoltos razbóra

Nagyon békés rajhalak, kiváló választás! Színeik egyszerűek, mégis lenyűgöző, elegáns halacskák! Nem véletlen töretlen népszerűsége az akvarisztikában!



Trigonostigma heteromorpha - elterjedési területe térképen

Trigonostigma heteromorpha

Első leírója: Duncker, 1904

Taxomófia: kingdom: *Animalia* phylum: *Chordata* class: *Actinopterygii* order: *Cypriniformes* family: *Cyprinidae* - pontyfélék genus: *Trigonostigma*

Eredeti hazájában Thaiföld, Malajzia és Szumátra patakjaiban, folyóiban fordul elő.

A fajtól gondozunk legalább 6, de inkább 8 egyedet. Teljesen békések, így minden olyan díszhállal társíthatjuk őket, melyek nem jelentenek rá veszélyt. Egy délkelet-ázsiai biotópba az egyik lehető legjobb választás, dániók, más razbórák, díszmárnák, talajlakó márnák és csíkfélék, gurámik kitűnő társhala lehet. Vegyes társas akváriumok szintén igen gyakran látott lakója e kis halacska, elevenszülők, békésebb törpesügérek, vértesharcsák, pontylazacok és szivárványhalak

mellett is tökéletes. Közkedvelt faj, ami gyakorlatilag minden díszállatüzletben beszerezhető!



Trigonostigma heteromorpha - Ékfoltos razbóra



Trigonostigma heteromorpha - Ékfoltos razbóra
nőstény

Ékszernek is beillene ez a hátsó-indiai szigetekről és Thaiföld déli részéről származó, parányi díszhal. Csaknem fél évszázadon át ellenállt minden tenyésztési kísérletnek. A kezdeti sikerek Szászország bizonyos területeire korlátozódtak, ahol lágy és gyengén savanyú volt a vezetékes víz. Később kiderült, hogy hazájában halunk az esős évszak beköszönteikor a mészkőben rendkívül szegény talajon csaknem tiszta esővízben ívik, amit a vízbe hullott lombok, gyümölcsök gyengén savanyítanak. Ezért ragaszkodik hasonló közeghez az akváriumban is.

Alább *Wiesinger* tenyésztési útmutatója olvasható ékfoltos razbórához:

Kellékek: 2 db kis akvárium, 1 db 50x 20x 20 cm-es akvárium, 8 liter desztillált víz, 10 l ozmóvíz vagy műgyantán átcsurgatott víz, esetleg szabadon gyűjtött esővíz, néhány marék német tőzeg, 1 púpozott kávéskanál timsó, 1 db virágcserep, vízinövények: *Cryptocoryne* vagy *Ludwigia*, esetleg *Sagittaria platyphylla*, 1 db gumicső, 1 db üvegpipa, néhány újságpapír és selyempapír, 1 db fiatal ivarérett hím és egy kétéves nőtény ékfoltos razbóra.



Trigonostigma heteromorpha - Ékfoltos razbóra csapat

tenyésztés előkészületeit négy héttel az ívatás megkezdése előtt indítsuk el. Gondosan megtisztított medencébe esővizet töltünk, és néhány marék német tőzeget dobunk bele. A tőzeg apró rostjai egy hónap múlva már biztosan leülepednek. Ekkor átszívjuk a leszívócsővel az esővizet egy másik, hasonló módon előkészített tartályba. A közben víz nélkül maradt tőzeget felfőzzük, és a még esetleg benne maradt idegen anyagoktól átválogatással megtisztítjuk.

Ha ez megtörtént, 50x20 cm alapterületű és 20 cm

magas, ugyancsak kimosott akvárium aljára terítjük. Most egy fehér selyempapír lapot fektetünk rá — mintha a szokott módon akváriumot rendeznénk be —, és kb. 8 cm magasságig felöntjük a már tőzeget megsavanyított esővizünkkel. (A víz a méréseknél kb. 3 pH-t mutat.) A vízszlop további emelését már desztillált vízzel folytatjuk, 16 cm magasságig. A desztillált víz ilyenkor csökkenti a savanyúságot, 5 pH-értékig. Ezután viszont a közben timsóval fertőtlenített növények steril virágcserepbe történő ültetésére is sor kerülhet. A virágcserepet homok helyett ugyancsak tőzeggel töltjük meg, és a medence közepére helyezzük. Bármelyik növényfajt is választjuk a felsoroltak közül, fontos, hogy annak levelei a vízfelszínre elérjék.



Trigonostigma heteromorpha - Ékfoltos razbóra fekete füstös változat

Az ékfoltos razbóra tenyészpárt épp úgy, mint a neonhalakat, üvegpipával, víz nélkül telepítsük át. Minthogy a trópusi esős évszak beköszöntött a halakat ívársra ingerli, az akváriumban is ezt utánozzuk. Igaz, hogy erre a célra nem egészen friss (infuzóriaveszély miatt!), hanem csak 8 napos esővizet használhatunk, és ez utóbbival további 2 cm-rel emeljük az akvárium vízszlopát (most már a vízszlop magassága 18 cm lesz).

Az akváriumvíz pH-értéke 5,5-5,7 lesz. Ha a vízhőmérséklet eléri a 25-27 °C-ot, ritka jelenetnek lehetünk szemtanúi. Az elénk táruló kép ugyanis csaknem egy fél évszázadon át váratott magára. 1906-tól, halunk első, szingapúri, illetve *Johore* tartományból való behozatalától a negyvenes

évek közepéig nem sikerült megoldani a rendszeres tenyésztését. A hím hosszas üldözés után a nőtényt "megnyergeli", vagyis lovagol a hátán, így száguldoznak végig az akváriumon. Majd a nőtény hanyatt fekszik egy levél alatt és várja — gyakran percekig — a partnerét. Az közeledik, és átöleli őt úgy, ahogy azt a nagyszárnyú hal (*Macropodus opercularis*) szokta tenni párjával.

Az ikrákat valamelyik levél alsó felére, vagyis a levélfonákra ragasztják. Ha néhány ikra lehull, akkor azok a tőzegben kelnek ki. A kikelés 24 óra múlva következik be. Az ikrázás befejezésétől számítva 6 napig tartó elsötétítés szükséges. Amikor az erre a célra felhasznált újságpapír függönyt felhúzzuk, meg kell kezdeni az ivadék etetését infuzóriával (ázalékállatokkal), vagy apró *Cyclops* naupliusokkal. Ékfoltos razbórát Magyarországon először Babocsay László és dr. Marton Szilárd tenyésztett a negyvenes évek végén.

(Tenyésztésekor nem muszáj ragaszkodni a biotópilag megfelelő növényekhez, szívesen ívik nagyobb levelű *Echinodorusok* fonákjára, sőt, akár szintén széles levelű műnövényre is, bár jobb az élő. A lehető legjobb módszer valóban Wiesinger által javasolt metódus, de a víz savanyítását-előkészítését egyszerűsíthetjük is akár készítményekkel, akár csak egy égertobozos "tea" adagolásával. Így is érhetünk el sikereket, de a legjobb akkor is a régi, az "eredeti" módszer marad!)

EGYÉB ELNEVEZÉSEK: syn: *Trigonostigma heteromorpha*.

Eng: Harlequin Rasbora, Red Rasbora, Harlequin fish.

Egyéb köznevei: Harlequin rasbora, Klínová parmička, Razbora klinowa, Razbora klínoskvrnná, Keilfleckbärbling.

KATEGÓRIÁK:

[2015, Akvarista Lexikon, A hónap díszhala](#)

KULCSSZAVAK:

[keeping](#), [Ékfoltos razbóra](#), [Trigonostigma heteromorpha](#), [tenyésztés](#), [2015](#), [tartás](#), [gabrínus](#), [díszhal](#), [április](#), [betegségek](#), [hónap díszhala](#), [származás](#), [akvárium](#), [aquarium](#), [breeding](#)

Beküldte: gabrinus

Katalógusba került: 2015-04-01 09:10:00

Legutolsó frissítés: 2022-01-18 15:01:02

Katalógus ID: 6785

Oldal linkje:

<https://akvaristalexikon.hu/akvarista-lexikon/a-honap-diszhala/ekfoltos-razbora.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva