

Enneacanthus obesus - Gyémántfoltos tőzogsüger

ELSŐ LEÍRÓJA:	Girard, 1854
CSALÁD:	Centrarchidae
MÉRET:	9,5 cm
C°:	10-22
pH°:	7,0-7,5
Nk°:	8,0-12
HELYIGÉNY:	100 liter
VISELKEDÉS:	békés, területvédő
TÁPLÁLÉK:	ragadozó
TARTÓZKODIK?	alsó- és középsőszint
ÉLETTARTAM:	5-8 év
TERM.VÉD.:	



Enneacanthus obesus
Gyémántfoltos tőzogsüger
(Girard, 1854)

TOVÁBBI KÉPEK:

TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Térkép még nem készült az adatlaphoz, feltöltése folyamatban!



Az Egyesült Államok egész keleti része, délen Floridától egészen az északi nagy tavakig.

Kristálytisza vizekben, folyók vagy tavak mellékágaiban, főleg olyan helyeken található, ahol a sűrű növényzet kellő számú rejtekhelyet biztosít.

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

A teste rövid és magas, csaknem tojás alakú, de oldalt erősen lapított. A kúp alakú fogak az ínyre is átnyúlnak.

A kopoltyúfedőkön néhány sor pikkely látható. Hazájában 10 cm hosszú; akváriumban már 5— 6 cm hosszú példányai is szaporodóképesek.

A vörösesbarna testen, főleg a hímen és ivási időben számos fényes zöld vagy aranyos petty látható. Az ivari különbségek olykor nem feltűnők; a hím általában kissé élénkebb színezetű, és a függőleges úszók jobban fejlettek.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Nagyon szép és kedvelt hidegvízi hal; nyugodt és békés természetű, ezért zavarásokra érzékeny.

Ha megijed teste könnyen görcsbe rándul, megmerevedik. Megtörténhet, hogy ilyen állapotban pusztul el.

A gyémántsüger meglehetősen nagy, dús növényzetű medencét igényel. Leginkább fajtársaival tartható együtt, nála élénkebb halakkal azonban semmi esetre se tegyük egy medencébe. Kedveli az átlátszó, szép tiszta, alaposan szellőztetett vizet; esetenként egy kis napsütést is megkíván. Az erős napfény azonban kerülendő.

A víz hőmérsékletre nem különösebben igényes, de hosszú időn át ne tartsuk 10— 12 C°-nál hidegebb vízben. Másrészt nem ajánlatos az állatokat melegen átteleltetni, mert akkor a következő évben betegségekre fogékonyak lesznek, és nem hajlandók szaporodni.

A többi dízsügerhez hasonlóan ez a faj is általában csak élőeséget fogyaszt, szárazeséget csak ritkán és nem szívesen fogad el. Tekintettel arra, hogy ha megijed, a talajnak rohan, célszerű puha, nem éles szemű homokfedőréteget alkalmazni.

Az ívás májustól szeptemberig tart. 18— 20 C° hőmérsékleten az ivari különbségek a hímen erőteljesen észrevehetőkké válnak. Az ikrákat vagy finoman szabdalt levelű növényekre, vagy ha ilyenek nincsenek, a helyszínen a hím által készített gödörbe rakják. A hím nem kergeti a nőtényt. A nőtény az ikra beérése után magától megjelenik az ívás helyén, ahol a hím már várja. A nászjátékok érdekesek és kecsesek. Ívás közben a hím valamivel a nőtény feje mögött áll, s úszóinak gyors mozgásával a megjelenő petéket a növények közé sodorja. A költőhelyet a hím őrzi. Az ivadékok kb. 2— 4 nap múlva kelnek ki, s a hím 7 napig, amíg még a növényeken lógnak, felületesen vigyáz rájuk. Ezután a leghelyesebb a hímet a medencéből eltávolítani. A vízszint ne legyen 15 cm-nél magasabb. Az ivadékok először *infuzóriumokkal*, majd, néhány nappal később igen finom élő porelességgel, *Artemiával* és kisegítő eleséggel is, pl. összenyomott televényférgekkel táplálkoznak. Még bőséges etetés esetében is lassan nőnek, csak két év múlva válnak szaporodóképessé. Célszerű az ivadékokat időnként nagyság szerint szétválogatni, mert a nagyobbak megtámadják kisebb testvéreiket. A gyémántsüger szabadtéri akváriumokban és meleg forrásoktól táplált tavacsákban is tenyészthető. Szigorú teleken azonban ki szokott pusztulni.

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: *Pomotis obesus*.

Eng:Banded sunfish.

Egyéb köznevei: Stribet Diamantaborre, Stribet solfisk, Sinitäpläahven, Täpläaurinkoahven, Diamantbarsch, окунь бриллиантовый, Brilliantovyi okun'.

KATEGÓRIÁK:

[Egyéb hidegvízi halak](#), [Akváriumi halak](#), [Hidegvízi halak](#)

KULCSSZAVAK:

[Akváriumi halak](#), [Enneacanthus obesus](#), [akvarisztika](#), [Egyéb hidegvízi halak](#), [Gyémántfoltos tőzegsügér](#), [Girard, 1854](#), [Centrarchidae](#), [Hidegvízi halak](#)

JELLEMZŐK:

[lassú mozgású](#), [hidegvízi élőhelyek](#), [sűrű növényzetigényű](#), [ragadozó](#), [Amerika](#), [állóvízi](#), [alsó szint](#), [közepes méretű 5-10 cm](#), [Észak-Amerika](#), [békés viselkedés](#), [átlátszó vízi](#), [kissé agresszív viselkedés](#), [közepesen áramló vízi](#), [lágyvízi \(5-10 Nk°\)](#), [lassan mozgó vízi](#), [hosszú életű 6 év fölött](#), [hidegvízi élőhelyek \(5-20°C\)](#), [közepesen aktív mozgású](#), [bújós](#), [közepes hőigényű \(20-25°C\)](#), [átlagos élethossza 3-6 év](#), [közepesen keményvízi \(10-15°Nk\)](#), [átlagos növényzetigényű](#), [normálméretű akvárium \(100-200 literig\)](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Írta: Honffy Gábor

Katalógusba került: 2011-01-15 09:01:17

Legutolsó frissítés: 2018-04-20 16:15:12

Katalógus ID: 4332

Oldal linkje: <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/hidegvizi-halak/egyeb-hidegvizi-halak/enneacanthus-obesus.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva