

Enteromius walkeri - Ghanai márna

ELSŐ LEÍRÓJA:	Boulenger, 1904
CSALÁD:	Cyprinidae
MÉRET:	10 cm
C°:	23-27
pH°:	6-7,5
Nk°:	5-12
HELYIGÉNY:	150 liter
VISELKEDÉS:	békés, rajhal
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	összes szint
ÉLETTARTAM:	5-8 év
TERM.VÉD.:	sérülékeny



Enteromius walkeri
Ghanai márna
(Boulenger, 1904)

TOVÁBBI KÉPEK:



TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Enteromius walkeri – Ghanai márna elterjedési területe (Map)

Nyugat-Afrika, azon belül is Nyugat-Ghana, ahol az Ofin és Ankobra folyók lakója.

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

Ennek az afrikai fajnak a teste nem olyan mély, mint az ázsiai márnaké, viszont megnyúltabb. Színe aranybarna, pikkelyei jól láthatók. Oldalán három, egyenletesen elhelyezkedő folt van és egy további halvány színű éppen a hátúszó alatt helyezkedik el. A két elülső foltot egy zezugos vonal köti össze. Szája és szeme nagy. A hátúszó és a kopoltyúfedő apró foltjai aranyos vörösek.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Kinézete hasonló egy másik afrikai fajéhoz, a hárompettyes díszmárnáéhoz (*B. trispilus*). Sajnos nem kapható túl gyakran, pedig remekül illik egy nyugat-afrikai biotóp medencébe! Csapatban kell tartani, szívesen bújkál a növényzet közt. Nem problémás hal, akár kezdők is foglalkozhatnak vele. Természetesen a halgondozás általános tételei rá is igazak, miszerint rendszeres részleges vízcserét kell tartani, de szerencsére nem egy igényes fajról beszélünk. Közepes vízáramlás mellett, egy Anubiasokkal viszonylag sűrűn beültetett, lehetőleg sötétebb talajú akváriumban kitűnően gondozható. Mint már említettük, remek választás egy kongói biotóp medencébe, ahová mellé kerülhetnek például meggyhasú sügerek, kongó- és afrikai nagypikkelyű pontylazacok, Schilbe - cápaharcsák vagy épp a Synodontisok, mint talajlakók. Arra viszont mindig figyeljünk, hogy legalább 6 márnát tartsunk együtt.

Táplálkozás szempontjából sem igényes, fogyasztja a száraz lemezes eledeleket egyaránt, de hálás egy kis vörös szúnyoglárváért, artémiáért is. Forrázott salátalevéllal is megkínálhatjuk időnként őket, hisz mindenevő halfajról beszélünk.

Tenyésztése akváriumban is megoldott, a többi hasonló díszmárnáéhoz hasonlatos. Lágy, közel semleges (egy kicsit savas) vízbe helyezzük ki a legszebb hímet és a leginkább beikrásodott nőtényt. Medencéjükbe ikrarácsot, finom levelű ivató növényeket is tehetünk, de amint lezajlott az ívás folyamata, a szülőket vissza kell tenni tartómedencéjükbe, mielőtt felfalják ikráikat. A kishalak artémiával és rotatóriával indíthatóak, később megfelelő méretnél vágott tubifexet, grindált és szúnyoglárvát kaphatnak. Sűrű vízcseré és nagy hely esetén több száz kishal is könnyedén felnevelhető.

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn.: helytelenül: Puntius camptacanthus (külön faj!) **Eng.: - Egyéb:** Parmička Walkerova, Zigzagbarbe

KATEGÓRIÁK:

[Pontyfélék](#), [Akváriumi halak](#)

KULCSSZAVAK:

[Pontyfélék](#), [Akváriumi halak](#), [akvarisztika](#), [Boulenger](#), [Enteromius walkeri](#), [Ghanai márna](#), [1904](#), [Cyprinidae](#)

JELLEMZŐK:

[középső szint](#), [hosszú életű 6 év fölött](#), [alsó szint](#), [felső szint](#), [lágyvízi \(5-10 Nk°\)](#), [átlagos élethossza 3-6 év](#), [Afrika](#), [átlagos növényzetigényű](#), [Atlanti országok](#), [sűrű növényzetigényű](#), [közepes hőigényű 20-25°C](#), [normálméretű akvárium 100-200 literig](#), [közepesen keményvízi 10-15°Nk](#), [nagy méretű 10-20 cm](#), [közepesen áramló vízi](#), [barna vízi](#), [Nyugat-Afrika](#), [lassan mozgó vízi](#), [félsavas \(6-6.5 pH\)](#), [közepesen aktív mozgású](#), [békés rajhal](#), [hőigényes \(25-30 °C\)](#), [mindenevő](#), [normál \(6.5-7.5 pH\)](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Írta: Honffy Gábor

Katalógusba került: 2009-06-05 09:01:15

Legutolsó frissítés: 2017-01-31 22:37:53

Katalógus ID: 3932

Oldal linkje: <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/pontyfelek/enteromius-walkeri.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva