

Fundulopanchax arnoldi - Arnold fogaspontya

ELSŐ LEÍRÓJA:	Boulenger, 1908
CSALÁD:	Nothobranchiidae
MÉRET:	5,5 cm
C°:	20,0-24,0
pH°:	5,8-7,2
Nk°:	8,0-15
HELYIGÉNY:	55 liter
VISELKEDÉS:	békés
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	felső és középső szint
ÉLETTARTAM:	3-5 év
TERM.VÉD.:	nem értékel



Fundulopanchax arnoldi

Arnold fogaspontya
(Boulenger, 1908)

TOVÁBBI KÉPEK:



TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Fundulopanchax arnoldi – Arnold fogaspontya elterjedési területe (Map)

A Niger deltavidékén, mocsarakban, árkokban és más kisebb vizekben.

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

A hím farkúszója háromlebenyes, a külső sugarak fonál alakban megnyúltak. Az úszó külső szegélye azonban a nőstényen is kissé ívelt (geschwungen). A pikkelyek viszonylag nagyok. Hosszúság: kb. 6,5 cm; a nőstény általában valamivel kisebb. A faj színezete erősen változó. Megnehezíti a dolgot, hogy a fajváltozatok nőstényei *Tusche* szerint alig különböztethetők meg egymástól. Viszont már annyira specializálódtak, hogy csak saját fajú hímjeikkel képesek fejlődőképes petéket létrehozni.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

A halak viselkedése hasonlít az *A. coeruleum* fajéhoz, s ezekhez hasonlóan marakodósak, falánkok és robusztusak. Ezért a legjobb őket magánosan tartani, annál is inkább, mert több hím nem fér össze egymással. Hőmérséklet 20—24 °C; magasabb hőmérsékleten ugyan élénkebbek, de gyengébbek és rövidebb életűek is. A petéket többnyire a talajra, néha azonban a fenék közelében levő gyökerekre, vagy növénynyalábokra rakják. Egy ivási periódus közben, amely mintegy 4 hétig tart, összesen 150—200 petét raknak le. Fejlődésük 20—22 °C-os hőmérsékleten mintegy 32 napig tart. A nemzetség leírásában közölt módszerek alkalmazandók.

Egyfajos akvárium esetében a megszabottól kisebb akvárium is bőven elegendő, egy 50 liter körüli medencében más ikrázó fogaspontyokkal is társítható!

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: *Aphyosemion arnoldi*, *Fundulus arnoldi*.

Eng: Arnold's killi.

Egyéb köznevei: Arnolds Prachtkärpfling, Orvokkiviiripyrstö.

KATEGÓRIÁK:

[Akváriumi halak](#), [Ikrázó fogaspontyok](#)

KULCSSZAVAK:

[Nothobranchiidae](#), [Arnold fogaspontya](#), [Fundulopanchax arnoldi](#), [Boulenger](#), [Akváriumi halak](#), [akvarisztika](#), [1908](#), [Ikrázó fogaspontyok](#)

JELLEMZŐK:

[keményvízi 15-20°Nk](#), [közepes hőigényű 20-25°C](#), [lassú mozgású](#), [átlátszó vízi](#), [sűrű növényzetigényű](#), [közepesen keményvízi 10-15°Nk](#), [állóvízi](#), [félsavas \(6-6.5 pH\)](#), [közepesméretű akvárium 50-100 literig](#), [barna vízi](#), [normál \(6.5-7.5 pH\)](#), [lassan mozgó vízi](#), [fekete vízi](#), [savas \(6pH alatt\)](#), [mindenevő](#), [Afrika](#), [békés viselkedés](#), [középső szint](#), [lágyvízi \(5-10 Nk°\)](#), [felső szint](#), [Nyugat-Afrika](#), [átlagos élethossza 3-6 év](#), [Niger](#), [átlagos növényzetigényű](#), [közepes méretű 5-10 cm](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Írta: Honffy Gábor

Katalógusba került: 2009-07-17 09:01:16

Legutolsó frissítés: 2013-08-30 13:04:37

Katalógus ID: 4063

Oldal linkje: <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/ikrazo-fogaspontyok/fundulopanchax-arnoldi.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva