

Fundulopanchax gularis - Nigeri fogaspony

ELSŐ LEÍRÓJA:	Boulenger, 1902
CSALÁD:	Nothobranchiidae
MÉRET:	9 cm
C°:	20-24,5
pH°:	6,0-7,0
Nk°:	5,0-12
HELYIGÉNY:	85 liter
VISELKEDÉS:	békés
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	összes szint
ÉLETTARTAM:	0,6 év
TERM.VÉD.:	nem értékel



Fundulopanchax gularis

Nigeri fogaspony

(Boulenger, 1902)

TOVÁBBI KÉPEK:

TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Fundulopanchax gularis – Nigeri fogaspony elterjedési területe (Map)



Kamerun és a Niger deltavidéke. Meglehetősen ritka, az árapály zónában is.

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

A farkúszó háromlebenyű. A hímek torkukon vörös jelzést viselnek. Hosszúság: hazájában 9 cm, az akváriumban mintegy 7 cm.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

A többi fajhoz hasonlóan tartandó, annyi különbséggel, hogy nagyobbra nő! Egyfajos medencének is mindenképpen egy 40-45 literes akváriumot rendezzünk be, a megadott literszámon esetleg társíthatjuk

is!

Az egyik legagresszívabb Fundulopanchax, kezdőknek nem is ajánlott. Elég rövid életű faj, 6-7 hónaposan már elvesztik aktivitásukat, a leghosszabb megfigyelt élettartam 9 hónap volt. Tartásukkor a fő problémát az agresszivitás és a bársony-betegségre való hajlam jelenti, így a kifogástalan tisztaság és rendszeres vízcsere elengedhetetlen. Sterba az "Freshwater Fishes" (Édesvízi halak) című könyvében írja, hogy a hímek nagyon kötekedők, területvédők.

Táplálása nem okoz problémát, szereti a szúnyogot és más nappali rovarokat, a szúnyoglárvát, a fagyasztott élelmeket (artemia, szúnyoglárva, Cyclops) de végszükségben a mesterséges tápok is elfogadja. Az apróra vágott giliszta etetése elősegíti az ikrásodást.

Az általános recept szerint a tenyésztést két-három nőtény per hím aránnyal kísérelhetjük meg egy viszonylag nagyobb tartályban, melynek fenéken elhelyezünk ívatómops-ot, vagy egy réteg tőzeget. A tőzegréteget cseréljük kéthetente, mielőtt körülbelül 6 hétig szárítottuk. Egyes beszámolók szerint az ivadékok 5-9 hét alatt kelnek ki, míg más beszámolók arra utalnak, hogy legalább 8 hétnek kell eltelni (ez az alkalmazott hőmérséklet függvénye). Néhány adatközlő szerint az ívási ciklus akár 100 ikrát is eredményezhet 1 nap alatt. Fry szerint az elúszott ivadékokok 5,8-6 mm hosszúak, színük barna, és már elúszás után képesek elfogyasztani frissen kikelt artemiát, vagy kis Cyclops rákot, mint indító eledelt. Növekedési ütemük elég gyors, a 2 hetes ivadék 11-13 mm hosszú, a 4 hetes 18-22 mm, az ivarérettséget nagyjából 4-5 (más adatok szerint 7-8) hét alatt érik el.

Konkrét tenyésztési tapasztalatokat Jaroslav Kadlec-től olvashatunk egy 1998 októberében megjelentett hírlevélben (BKA newsletter No.397), amikor is a tenyésztéshez nagyon lágy vizet alkalmaztak. A víz összetétele szerint desztillált víz, MgSO₄ (magnézium-szulfát) tartalommal, keménysége 0,3-0,8 °Nk. Az akvárium ürtartalma 5-8 liter volt 2 cm réteg tőzeggel az alján. Jól kondicionált halakat - 1 hím és 2-3 nőtény helyeztek át az így előkészített tartályba, ahol az ívás megtörtént nagyjából 3-8 óra elteltével. Az ívás után a halakat eltávolították külön akváriumokba és jól táplálás mellett pihentették őket 2-4 napig. Miután 3-4 szaporítási munkameneten túlestek a tőzeget eltávolították, majd újságlapok közt szárítás után az ikrákat eltárolták. Ha a tárolási hőmérséklet 23-25 °C - akkor az ikrákon a lárva szeme a 7.-8. héten fedezhető fel. A magasabb tárolási hőmérsékleten gyorsabb a fejlődés. 19 °C-on az embrionális fejlődés leáll és az ikra megromlik. Nedvesítéshez 10-12 °C-os közepesen kemény vizet lehet használni. Egy másik recept szerint a már lerakott ikrákat tartalmazó tőzeg felett hagyjunk 1-2 cm magas 20-22 °C-os vizet 14-20 napig, miközben a tartályt elsötétítjük. Ezután öntsük az ikrás tőzeget egy finomabb hálóra és finom nyomással szorítsuk ki a vizet a tőzegeből, de csak amíg nem kezd erősebben összetömörödni. Az egészet helyezzük egy tálba, és amikor a felső réteg kiszáradt fedjük le, és hagyjuk pihenni újabb 14 napig (más források szerint akár 2 hónapig is) 20 °C-on (inkubáció). Ezután az idő után öntsünk rá esővizet (22°C-osat), minek következtében néhány óra múlva elkezdenek kikelni az ivadékok.

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: *Fundulus gularis* Boulenger 1901, *Fundulus gularis* var. *B.* Arnold 1908, *Fundulus gularis forma typica* Arnold 1911, *Fundulus gularis* "Gelb" KUHN 1923 (Sárga Fundulus), *Fundulopanchax gularis* Rachow 1928, *Aphyosemion gulare* Myers 1933, *Aphyosemion gularis* Ladewig 1935, *Aphyosemion beauforti* (nem: Ahl 1924) Klee és Turner 1962, *Aphyosemion gulare beauforti* Gandert 1969, *Aphyosemion* (*Fundulopanchax*) *gulare* Radda 1970, *Aphyosemion faiiax* (nem: Ahl 1935) Scheel &

Radda 1974

Eng: Gulare.

Egyéb köznevei: Afiosemission zhelyi, Hohtoviiripyrstö, Weißkehl-Prachtkärpfling, Deba-ogoin.

KATEGÓRIÁK:

[Akváriumi halak](#), [Ikrázó fogasponyok](#)

KULCSSZAVAK:

[Fundulopanchax gularis](#), [Nigeri fogaspony](#), [1902](#), [Boulenger](#), [Akváriumi halak](#), [Ikrázó fogasponyok](#), [akvarisztika](#), [Nothobranchiidae](#)

JELLEMZŐK:

[bújós](#), [közepes hőigényű 20-25°C](#), [állóvízi](#), [átlátszó vízi](#), [barna vízi](#), [közepesen keményvízi 10-15°Nk](#), [rövid életű 1-3 év](#), [félsavas \(6-6.5 pH\)](#), [közepesméretű akvárium 50-100 literig](#), [normál \(6.5-7.5 pH\)](#), [lassan mozgó vízi](#), [Afrika](#), [alsó szint](#), [mindenevő](#), [békés viselkedés](#), [középső szint](#), [Nyugat-Afrika](#), [lágyvízi \(5-10 Nk°\)](#), [felső szint](#), [Niger](#), [átlagos növényzetigényű](#), [lassú mozgású](#), [közepes méretű 5-10 cm](#), [sűrű növényzetigényű](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

http://www.aka.org/wak/Ref_Library/Fundulopanchax/Fp.gularis.htm

http://rybicky.net/atlasryb/halancik_krasnoocasy

Írta: Honffy Gábor

Katalógusba került: 2009-07-17 09:01:16

Legutolsó frissítés: 2017-02-01 12:58:05

Katalógus ID: 4075

Oldal linkje: <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/ikrazo-fogasponyok/fundulopanchax-gularis.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva