

Fundulopanchax walkeri - Walker - fogasponty

ELSŐ LEÍRÓJA:	Boulenger, 1911
CSALÁD:	Nothobranchiidae
MÉRET:	6 cm
C°:	20-24
pH°:	6,0-7,0
Nk°:	5,0-12
HELYIGÉNY:	60 liter
VISELKEDÉS:	békés
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	összes szint
ÉLETTARTAM:	3-5 év
TERM.VÉD.:	nem értékelt



Fundulopanchax walkeri

Walker - fogasponty
(Boulenger, 1911)

TOVÁBBI KÉPEK:

Képek feltöltés alatt!

TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Fundulopanchax walkeri – Walker – fogasponty elterjedési területe (Map)

Bandama, Comoé és a *Bia* folyók vízrendszere közép-, dél- és Kelet-Elefántcsontpart (*Cote d'Ivoire*), valamint a *Bia, Tano, Ankobra* és *Oda* folyók vízgyűjtője délnyugat-Ghánában.

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

A test kerekded keresztmetszetű, viszonylag erőteljesnek hat. A farkúszó külső sugarai kissé megnyúltak, a középső rész enyhén kifelé ível. Hosszúság: 8 cm-ig. A színezet a származási helytől függően kissé változó. Az oldalak kékes színűek, s lila vagy zöld színben csillognak. A hát barna, a has sárgásbarna. A kopoltyú-fedőn féreg alakú vörösesbarna szalagok, minden egyes pikkelyen egy-egy vöröses-barna folt látható. A foltok laza csíkokká egyesülhetnek. Az úszók általában vörös szegélyűek, alapszínük

sárgászöld, a farok-úszó sárgás színű, közepütt kék vagy vörös foltok vannak rajta. A nőstény barnás színű, kopoltyúfedőin barnás féreg alakú foltok vannak, úszói lekerekítettek és színtelenek vagy halványsárgásak.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Lágy, enyhén savanyú vizet kíván. Hőmérséklet: 22—23 C°. Fenékre ívó; ikráit a fenékre rakja. Az ikrák akár a vízben, akár tálakban — csupán nedvesen tartva — egyaránt kikeltethetők. Az embrionális fejlődés tartama 4—6 hét. Az ivadékok igen gyors növésűek. Bőséges etetés esetén 6 hét múlva már elérhetik a 3—4 cm hosszúságot. Tenyésztésbe azonban nem szabad őket korán befogni. Kisebb akváriumban egyfajos módon tartható!

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: *Aphyosemion spurelli*, *Aphyosemion walkeri*, *Fundulus walkeri*, *Nothobranchius walkeri*.

Eng: Walkers killi.

Egyéb köznevei: Safiiriviiripyrstő, Walkers Prachtkärpfling.

KATEGÓRIÁK:

[Akváriumi halak](#), [Ikrázó fogaspontyok](#)

KULCSSZAVAK:

[akvarisztika](#), [Ikrázó fogaspontyok](#), [Nothobranchiidae](#), [Fundulopanchax walkeri](#), [Walker - fogasponty](#), [1911](#), [Boulenger](#), [Akváriumi halak](#)

JELLEMZŐK:

[átlagos élethossza 3-6 év](#), [közepes méretű 5-10 cm](#), [átlagos növényzetigényű](#), [közepes hőigényű 20-25°C](#), [lassú mozgású](#), [átlátszó vízi](#), [sűrű növényzetigényű](#), [közepesen keményvízi 10-15°Nk](#), [állóvízi](#), [félsavas \(6-6.5 pH\)](#), [közepesméretű akvárium 50-100 literig](#), [barna vízi](#), [normál \(6.5-7.5 pH\)](#), [lassan mozgó vízi](#), [alsó szint](#), [közepesen aktív mozgású](#), [Afrika](#), [békés viselkedés](#), [mindenevő](#), [Atlanti országok](#), [lágvízi \(5-10 Nk°\)](#), [középső szint](#), [felső szint](#), [Nyugat-Afrika](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Írta: Honffy Gábor

Katalógusba került: 2009-07-17 09:01:16

Legutolsó frissítés: 2017-08-03 22:14:57

Katalógus ID: 4083

Oldal linkje: <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/ikrazo-fogaspontyok/fundulopanchax->

[walkeri.html](#)

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva