Garra cambodgiensis - Hamis sziámi algázó

ELSŐ LEÍRÓJA:	Tirant, 1883
CSALÁD:	Cyprinidae
MÉRET:	12-15 cm
C°:	20-25
pH°:	6-8
Nk°:	2-10
HELYIGÉNY:	200 liter
VISELKEDÉS:	békés
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	leginkább talajlakó
ÉLETTARTAM:	4-5 év
TERM.VÉD.:	gyakori



Garra cambodgiensis
Hamis sziámi algázó
(Tirant, 1883)

TOVÁBBI KÉPEK:









TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Térkép még nem készült az adatlaphoz, feltöltése folyamatban!

Ázsiában él, a *Mekong* és a *Chao Phraya* folyók vízgyűjtőiben, valamint a Maláj félszigeten.

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

A hamis sziámi algázó alsóállású száján négy bajusz található. Teste hosszúkás, orsó alakú, oldalain arany alapon a farokúszótól kezdve egy jellegzetes sötét csík húzódik keresztül egészen az orra hegyéig. Hasa fehér, háta sötét. Úszói áttetszőek, kivéve a mellúszókat, ezek ugyanis narancsosak.

Fiatal példányoknál az ivarok megállapítása nehéz, de az ivarérett hímeknél kialakul egy kis világos vörös szín száj körül. A szaporodóképes nőstények észrevehetően vastagabb testűek a hím példányoknál, ez jelzi hogy tele vannak ikrával. Mindkét nemnél találhatóak gumószerű kitüremkedések az orr környékén,

de a hímeken több van.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Az idevonatkozó szakirodalom nagy része szerint ez a faj kizárólagos növényevő, de az akváriumi példányok úgy tűnik, hogy élvezettel fogyasztják a jó minőségű szárított termékeket, valamint a hústartalmú táplálékot is, úgymint az élő vagy fagyasztott szúnyoglárva, Tubifex, Artemia, aprított garnéla, stb. Algát is eszik természetesen, hiszen a legfőbb táplálékszerzési módszerük az akvárium berendezésére tapadt algák legelészése. Itt meg kell jegyeznünk, hogy a rettegett piros-fekete ecsetalgát (Audouinella spp.) a tapasztalatok szerint nem fogyasztják, csak más hasonló fajok (Crossocheilus sp.). Kiegészítésként naponta adjunk nekik egy tabletta spirulinát is.

Kiválóan alkalmas a Dél-Ázsiai biotóp jellegű akváriumokba, bár saját fajtársait idősebb korban kevésbé tolerálja, az ott honos többi hallal (*Barilius, Danio, Devario, Puntius, Pethia, Systomus, Botia, Sinibotia, Yasuhikotakia, Acanthocobitis, Nemacheilus, Schistura, Beaufortia, Homaloptera, Gastromyzon, Pseudogastromyzon, Sewellia* stb.) jól kijön. Az a jó, ha csak kisebb csapatot tartunk együtt (3-4 fő), mert így minden gond nélkül fel tudják állítani egymás között a sorrendet (hierarchia), és sikeresen fel is osztják az akvárium berendezéseit. Búvóhelyeket biztosítsunk számukra!

Rendszeresen cseréljük vizüket, mert a felhalmozódó károsanyag-tartalmat rosszul viseli. Érdemes erős szűrőt használni, akár külső szűrőt is, mind a víz tisztántartása, mind az áramlatkeltés, mind a magasabb oxigénszint érdekében, amit e kedves halak nagyon is kedvelnek.

Akváriumi szaporodását eddig csak hormon bevitellel sikerült beindítani. Egy 2004-es tanulmány az ikrák kikeltek mindössze 15-16 óra elteltével, 25-29 ° C hőmérsékleten. Az ivadékokat elúszás után *Rotatoriá*val és *Moiná*val táplálva több mint 90%-os az első hónapban a túlélési arány.

Gyakran összetévesztik a sziámi ormányosmárnával és a díszesszárnyú márnával, általában előbbiek szinonima neveivel árusítják (repülő róka, ál-repülő róka, stb.)

Nagyon fontos pontos megkülönböztetésük, már csak azért is, mert a sziámi ormányosmárna megeszi az ecsetalgát, ez a faj pedig nem!

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: *Cirrhina cambodgiensis, Garra parvifilum, Garra taeniata, Garra taeniatops, Epalzeorhynchos sp.*

Eng: False Siamese Algae Eater, Stonelapping Minnow, False Flying Fox.

Egyéb köznevei: Gara kambodžská, Juovaimubarbi, Längsband-Saugbarbe, Pba gaw hin.

KATEGÓRIÁK:

Pontyfélék, Akváriumi halak

KULCSSZAVAK:

Cyprinidae, Pontyfélék, Tirant, 1883, Garra cambodgiensis, Akváriumi halak, Hamis sziámi algázó, akvarisztika

JELLEMZŐK:

félsavas (6-6.5 pH), átlátszó vízi, sárga vízi, normál (6.5-7.5 pH), közepesen áramló vízi, nagyon aktív mozgású, alsó szint, közepesen aktív mozgású, gyors vízáramlású, békés viselkedés, mindenevő, igenlágyvízi (0-5°Nk), átlagos élethossza 3-6 év, lágyvízi (5-10 Nk°), átlagos növényzetigényű, normálméretű akvárium 100-200 literig, nagyméretű 10-20 cm, Ázsia, Dél-Ázsia, féllúgos (7.5-8 pH), közepes hőigényű 20-25°C, Thaiföld.

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Írta: Honffy Gábor
Katalógusba került: 2010-12-18 09:01:17
Legutolsó frissítés: 2014-06-17 21:36:37
Katalógus ID: 4324
Oldal linkje: https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/pontyfelek/garra-cambodgiensis.html

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva