

Gasterosteus aculeatus aculeatus - Háromtűskés pikó

ELSŐ LEÍRÓJA:	Linnaeus, 1758
CSALÁD:	Gasterosteiformes
MÉRET:	5,0 (11) cm
C°:	4,0-20,0
pH°:	Változatos; 6,0-9,0
Nk°:	Édes-, brakk- és tengervíz; 2,0-20
HELYIGÉNY:	80 liter
VISELKEDÉS:	nem társas hal
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	alsó- és középsőszint
ÉLETTARTAM:	5-6,max.8 év
TERM.VÉD.:	



Gasterosteus aculeatus aculeatus

Háromtűskés pikó

(Linnaeus, 1758)

TOVÁBBI KÉPEK:



TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Térkép még nem készült az adatlaphoz, feltöltése folyamatban!

Elterjedési területük kizárólag az északi földgömb; részben édesvizekben, részben a tengerben tartózkodnak; az egyikből a másikba is átúsznak.

Európa, Észak-Ázsia, Észak-Amerika (az utóbbi földrészen még egy nem, az *Apeltes* is képviseli). Az utóbbi időben a faj a Duna és a Földközi-tenger térségébe is bevándorolt, ill. részben betelepítették.

A legkülönbözőbb vizekben megtalálható, fűlényekben és a tengerben egyaránt.

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

A pikóknak négy fésűs kopoltyújuk van. Hátúszójuk elülső része néhány vastag, szabadon álló tüskévé alakult át. Nyúlánk, orsó alakú halak, 3— 9, vagy még több háti tüskéjük, egy pár vastag, hasi tüskéjük van, amelyek a hasúszóból alakultak át. Ehhez a fark alatti úszó előtt még egy rövid tüske járul. A tüskés pikó harmadik tüskéje szintén csak rövid tövis a hátúszó előtt. A test csupasz, vagy többé-kevésbé sorokká rendeződő csontpajzsokkal páncélozott.

A HÁROMTÜSKÉS PIKÓ oldalai lehetnek többé-kevésbé csontpajzsokkal páncélozottak, vagy teljesen csupaszok. A páncélozástól függően 5 különböző formát különböztetünk meg. Hosszúsága: 6 cm vagy több, a helyi viszonyoktól függően.

Ezüstös fényű, sötét szürkészöld, erősen változó foltos. A hím hasa íváskor élénkvröcs, s háta élénkzöld színű. A nőstény teltebb. Az ívási időn kívül a fiatalabb példányok ivara néha nehezen különböztethető meg.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Gasterosteidae — a *Thoracostei* rendbe tartozó család (Pikófélek);

Származásuk még nem teljesen tisztázott.

A pikók érdekes akvárium halak. Elevenek, marakodók, íváskor színpompásak, és nagyon "értelmesek". Szokásaik minden tekintetben érdekesek, különösen az ivadék gondozás, amelyet a hím végez (apai család!). A hím növényi részekből fészket épít, s őrizi az azokban elhelyezett petéket és a kikelő utódokat. A fészkek elhagyása után még néhány napig vezetgeti ivadékait.

Noha a pikók kisebb medencével is megelégszenek, mégse tegyük őket túl kicsiny tartályokba. Több pár együttes tartása és érdekes viadalaik megfigyelése csak nagyobb akváriumban lehetséges. A pikók szokásait részletesen megvizsgálták, s megállapították, hogy színezetük bizonyos viselkedési fázisokhoz kapcsolódik, s hogy az ivadék gondozást végző hímek kölcsönösen tiszteletben tartják egymás költési körzeteit, ha a rendelkezésre álló hely nagysága velük született igényüknek megfelelő.

Igénytelen hidegvízi hal, amely nem túlzottan oxigénigényes. Ideiglenesen 20 C° fölött hőmérsékleteket is egészen jól eltűr. Célszerű az akvárium sarkaiba és világos oldalára sűrű növényzetet telepíteni, s más módon is gondoskodni rejtekhelyekről. Bármilyen táplálékot elfogadnak, de egyértelműen az élőleleséget részesítik előnyben. A tenyésztés könnyű, az ivadékok porfinomságú élőleleséggel, lemezessel és mikróval is felnevelhetők.

Ajánlatos egy hímre több nőstényt számítani, hogy a fészkek teljesen megteljenek utódokkal. Az íváásra érett nőstények feszülő hasukról könnyen felismerhetők. Ivás után eltávolítandók, a hímet azonban csak az ivadék gondozás befejeztével kell kivenni, mikor az ivadékok elkezdenek szétszóródni.

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: *Gasteracanthus cataphractus*, *Gasterosteus aculeatus algeriensis*, *Gasterosteus aculeatus messinicus*, *Gasterosteus aculeatus microcephalus*, *Gasterosteus algeriensis*, *Gasterosteus argentatissimus*, *Gasterosteus*

argyropomus, Gasterosteus atkinsi, Gasterosteus atkinsii, Gasterosteus bailloni, Gasterosteus biaculeatus, Gasterosteus biarmatus, Gasterosteus bispinosus, Gasterosteus brachycentrus, Gasterosteus cataphractus, Gasterosteus cuvieri, Gasterosteus Dekayi, Gasterosteus dimidiatus, Gasterosteus elegans, Gasterosteus gymnurus, Gasterosteus hologymnus, Gasterosteus inopinatus, Gasterosteus insculptus, Gasterosteus intermedius, Gasterosteus islandicus, Gasterosteus leiurus, Gasterosteus loricatus, Gasterosteus microcephalus, Gasterosteus nemausensis, Gasterosteus neoboracensis, Gasterosteus neustrianus, Gasterosteus niger, Gasterosteus noveboracensis, Gasterosteus obolarius, Gasterosteus plebeius, Gasterosteus ponticus, Gasterosteus pugetti, Gasterosteus quadrispinosa, Gasterosteus quadrispinosus, Gasterosteus semiarmatus, Gasterosteus semiloricatus, Gasterosteus serratus, Gasterosteus spinulosus, Gasterosteus suppositus, Gasterosteus teraculeatus, Gasterosteus tetracanthus, Gasterosteus texanus, Gasterosteus trachurus, Gasterosteus hologymnus.

Eng: Three-Spined Stickleback, Banstickle, Barnystickle, Barnytickle, Branchy, Branstickle, Burnstickle, Common stickleback, Cushy, Doctor, Eastern stickleback, European stickleback, Jacksharp, New York stickleback, Pinfish, Prickley, Saw-finned stickleback, Spanicle, Spannystickle, Spawn, Thorny back, Three-spined stickleback, Tiddler, Twospine stickleback.

Egyéb köznevei: Cukilrua'ak, Kedrinka, Espinós, Koljuška, Koljueka triostna, Trepigget hundestejle, Stekelbaars, Ogalik, Beinmurtur, Eldmurtur, Eyriðasild, Horngeil, Horngeir, Hvasssíl, Kombikk, خاره سه, Kolmipiikki, Arselet, Cordonnier, Crève-valet, Épinart, Épinglet, Épinoche, Épinoche à trois épines, Estancelin, Estranglo cat, Spinaubé, Spinavaou, Stichling, Agathero, Snathaid mhara, Dreistacheliger Stichling, Dreistachliger Stichling, Großer Stichling, Rotzbarsch, Seestichling, Stachel de butz, Αγκαθερό, Agathero, Σκυλόψαρο, Σταυρίδι, Hornsíli, Kakelashuk, Kakilaychok, Hariyo, Itoyo, Trisadatu stagars, Trispygle dygle, Stikling, Trepigget stingsild, Sehkhareh, Ciernik, Esgana-gata, Esgana-gata, Esganagata, Espinhela, Peixe-espinho, Peixe-espinho, Ghidrin, Trekhiglaja koliushka, Trekhiglaya kolyushka, Bodonja, Pichlavka, Pichlavka siná, Zet, Espinocho, Espinosillo, Espinoso, Nakenspigg, Storspigg, Dikence baligi, Dikence baliği, Trigolkova koluchka.

KATEGÓRIÁK:

[Hazai halak](#), [Akváriumi halak](#), [Hidegvízi halak](#)

KULCSSZAVAK:

[Gasterosteus aculeatus aculeatus](#), [Háromtüskés pikó](#), [1758](#), [Linnaeus](#), [Hazai halfajták](#), [Akváriumi halak](#), [akvarisztika](#), [Gasterosteiformes](#)

JELLEMZŐK:

[Amerika](#), [összeférhetetlen viselkedés](#), [állóvízi](#), [közepes méretű 5-10 cm](#), [hidegvízű élőhelyek \(5-20°C\)](#), [barna vízi](#), [átlátszó vízi](#), [rendkívül keményvízi 30°Nk felett](#), [Ázsia](#), [féllúgos \(7.5-8 pH\)](#), [közepesen keményvízi 10-15°Nk](#), [Észak-Amerika](#), [félsavas \(6-6.5 pH\)](#), [lassan mozgó vízi](#), [normál \(6.5-7.5 pH\)](#), [közepesen aktív mozgású](#), [savas \(6pH alatt\)](#), [mindenevő](#), [Európa](#), [lúgos \(8pH-nál több\)](#), [középső szint](#), [alsó szint](#), [átlagos élethossza 3-6 év](#), [hidegvízű élőhelyek](#), [nagyon keményvízi \(20-30°Nk\)](#), [átlagos növényzetigényű](#), [Észak-Ázsia](#), [lágóvízi \(5-10 Nk°\)](#), [keményvízi 15-20°Nk](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Írta: Honffy Gábor

Katalógusba került: 2010-12-05 09:01:17

Legutolsó frissítés: 2013-02-22 13:45:25

Katalógus ID: 4319

Oldal linkje: <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/hidegvizi-halak/hazai-halak/gasterosteus-aculeatus-aculeatus.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva