

Geophagus surinamensis - Pirossávos földevősüger

ELSŐ LEÍRÓJA:	Bloch, 1791
CSALÁD:	Cichlidae
MÉRET:	20-25 cm
C°:	23-26
pH°:	6-7
Nk°:	0-12
HELYIGÉNY:	250 liter
VISELKEDÉS:	aránylag társas
TÁPLÁLÉK:	mindenevő, elsősorban ragadozó
TARTÓZKODIK?	alsó- és középső szint
ÉLETTARTAM:	10 év
TERM.VÉD.:	nem értékelt



Geophagus surinamensis
Pirossávos földevősüger
(Bloch, 1791)

TOVÁBBI KÉPEK:



TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Geophagus surinamensis – Pirossávos földevősüger elterjedési területe (Map)

Dél-Amerika; Suriname

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

Nagy fejű, magas hátú süger. Úszóinak külső sugarai szép fonalasan megnyúltak. Sárgászöld alapszínét piros hosszanti csíkokkák tarkítják, úszói pirosak. Teste közepén egy fekete folt található. A nőstények kisebbek, fakóbbak, és úszói kevésbé megnyúltak.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Helyigényes mérete végett, de kezelhető süger. Békésen viselkedik, ezért agresszív fajokkal ne társítsuk.

Nagyobb lazacokkal, harcsákkal, békésebb sügerekkel rakható egybe. Talajtűrő faj, a természetben a talaj átrostálásával gyűjti össze táplálékát. Növényeket szinte felesleges ültetni, kitúrja őket, legfeljebb nagyon erős anubiasokat. Aprószemű sódertalajt helyezzünk medencéjébe, és nagy ágakkal remekül dekorálhatunk. Kristálytisza, bomlástermékmentes vizet igényel, erős külső szűrővel és gyakori vízcserékkel. Ha ez nem teljesül, és vize nem tiszta, akkor könnyen kialakul nála a fejlyukasodás. Etetésére sügérpelletek, fagyasztott és élő eleségek egyaránt alkalmasak, de néha egy kis spirulinás táppal is kiegészíthetjük, mivel egy kevés növényi tápanyagot is fogyaszt.

A párokat savasabb és melegebb vízbe helyezzük. Lapos kőre vagy sóderben általuk kiásott gödörbe szívesen ikráznak. Az ikrák száma könnyen elérheti az 500-at is. Az ikrázástól számított két hét múlva kezdhető meg etetésük sőrakkal, rotatóriával, walterféreggel. Általában 3 nap a kelési idő, de a teljes elúszás idejéig több idő telik el. Anyai szájköltők, veszély esetén az első időkben egyből szájába veszi kicsinyeit.

Nagyon dekoratív, remekül kezelhető viselkedésű, gyönyörű amerikai sügér faj!

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: *Sparus surinamensis*, *Sparus trimaculatus*.

Eng: Red Striped Earth Eater, Redstripe Earth eater, Mother-of-pearl earth eater, Opalescent earth eater.

Egyéb köznevei: Prapra roch, Prapra roche, Prapra so, Prapra soléy, San fichi, Punaevätonkija, Perle du Suriname, Tampokopo, Surinam-Perlfisch, Surninam-Erdfresser, Pakotala, Wakay, Acará, Acará tinga, Acará-bicudo, Acará-pitanga, Cará, Cará de praia, Cará roe roe, Cará tabaco doido, Juquiá, Songe, Surinamesisk Jordtare, Hawa lipa.

KATEGÓRIÁK:

[Amerikai fajok](#), [Akváriumi halak](#), [Bölcsőszájú halak](#)

KULCSSZAVAK:

[1791](#), [akvarisztika](#), [Geophagus surinamensis](#), [Pirossávos földévősügér](#), [Bloch](#), [Cichlidae](#), [Amerikai bölcsőszájúhalak](#), [Akváriumi halak](#)

JELLEMZŐK:

[lassú mozgású](#), [ragadozó](#), [Amerika](#), [barna vízi](#), [közepes hőigényű 20-25°C](#), [Dél-amerika](#), [nagy \(több 200 liternél\)](#), [átlátszó vízi](#), [Guyanak](#), [félsavas \(6-6.5 pH\)](#), [közepesen keményvízi 10-15°Nk](#), [hosszú életű 6 év fölött](#), [hőigényes \(25-30 °C\)](#), [közepesen áramló vízi](#), [gyér növényzetigényű](#), [normál \(6.5-7.5 pH\)](#), [lassan mozgó vízi](#), [óriás méretű 20 cm fölött](#), [alsó szint](#), [közepesen aktív mozgású](#), [kissé agresszív viselkedés](#), [mindenevő](#), [igenlágyművi \(0-5°Nk\)](#), [középső szint](#), [lágyművi \(5-10 Nk°\)](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Írta: Liziczai Márk

Katalógusba került: 2012-08-24 09:01:17

Legutolsó frissítés: 2013-11-11 12:34:59

Katalógus ID: 4417

Oldal linkje: https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/bolcsoszaju_halak/amerikai-fajok/geophagus-surinamensis.html

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva