

Hemigrammus pulcher - Aranyfoltos pontylazac

ELSŐ LEÍRÓJA:	Ladiges, 1938
CSALÁD:	Characidae
MÉRET:	5 cm
C°:	24
pH°:	6,0-7,0
Nk°:	2,0-15
HELYIGÉNY:	65 liter
VISELKEDÉS:	békés
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	összes szint
ÉLETTARTAM:	5-8 év
TERM.VÉD.:	



Hemigrammus pulcher

Aranyfoltos pontylazac

(Ladiges, 1938)

TOVÁBBI KÉPEK:

TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Hemigrammus pulcher – Aranyfoltos pontylazac elterjedési területe (Map)



Az Amazonas perui szakasza.

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

A család többi fajával összehasonlítva, a kecses pontylazac teste mélyebb. A kifejlett példányok feje és hátoldala sötét szürkészöld, bíborfényű rezes árnyalattal. A test alsó része ezüstös. Mint minden ezüsfényű hal esetében, testszíne a megvilágítástól függ. A pikkelyek széle sötét, a szem felül vörös, alul kékeszöld. A faroknyél felső részét aranyló sáv díszíti, az alatt pedig egy sötét folt van, ami előre felé a hátúszó magasságában végződik. A test két oldala zöldestől vörösesig terjedő színben csillogó, sárgászöld, világító vállfolttal, a faroknyélen rövid, széles fekete csík van, amelyet alul és felül fényes arany sárga szegély övezhet. A hím valamivel karcsúbb, mint a nőstény.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

A népszerű hal fogságban is szaporodik, de vonakodik ikrázni, ha nincs teljes összhang a két ivar között. A hímnek ikrától duzzadó nőtényt mutassunk be egy dús növényzetű, 60 cm-es szaporító medencében. Nem annyira élénk azonban, mint a nem sok más tagja, de távolról sem félénk. A színek sötét talajágy esetében különösen szépen érvényesülnek. A tenyésztés nehéz, a víznek lágynak és enyhén savas kémhatásúnak kell lennie, 26— 28 C° hőmérsékletre van szükség. A tenyésztést a legjobb öntöttüveg medencében megkísérelni, amelynek károsan tisztának és infuzóriumoktól mentesnek kell lennie. Az ivási aktus a kora hajnali órákban folyik le, tartama mintegy egy óra. 400— 600 petét raknak. Az ikra lerakása után a szülőket ki kell venni, s a medencét el kell egy kissé sötétíteni. Az ivadékok 24 óra múlva bújnak ki, további 3— 4 napra van szükségük ahhoz, hogy szabadon úszkáljanak. Ekkorra a medence elsötétítése megszüntethető. Az ivadékok nagyon kicsinyek és gyengék, lassan növekednek, s gondos kezelésre van szükségük.

Tartása egyszerű, kezdőknek is ajánlható. Gyakran együtt árulják a parázsszemű pontylazacokkal, nagyon hasonlít rá!

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: -.

Eng: Black wedge tetra, Garnet tetra, Pretty tetra, Loistotetra.

Egyéb köznevei: Pragtettra, Pretty, Loistotetra, Karfunkelsalmler, Zwinnik latarnik, Granatovaya tetra, Mojarita, Sardinita, Tetra granate, Kilfläckstetra.

KATEGÓRIÁK:

[Pontylazacok](#), [Akváriumi halak](#)

KULCSSZAVAK:

[1938](#), [Characidae](#), [Pontylazacok](#), [Aranyfoltos pontylazac](#), [Hemigrammus pulcher](#), [Ladiges](#), [Akváriumi halak](#), [akvarisztika](#)

JELLEMZŐK:

[Dél-amerika](#), [békés rajhal](#), [hosszú életű 6 év fölött](#), [fekete vízi](#), [Andok orsz.](#), [Kelet-Dél-Amerika](#), [Peru](#), [barna vízi](#), [félsavas \(6-6.5 pH\)](#), [normál \(6.5-7.5 pH\)](#), [alsó szint](#), [igenlágvízi \(0-5°Nk\)](#), [lágvízi \(5-10 Nk°\)](#), [Amazónia](#), [Amerika](#), [közepes méretű 5-10 cm](#), [közepes hőigényű 20-25°C](#), [átlátszó vízi](#), [közepesen keményvízi 10-15°Nk](#), [közepesméretű akvárium 50-100 literig](#), [közepesen áramló vízi](#), [közepesen aktív mozgású](#), [mindenevő](#), [középső szint](#), [felső szint](#), [átlagos élethossza 3-6 év](#), [átlagos növényzetigényű](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Írta: Honffy Gábor

Katalógusba került: 2008-05-12 09:01:16

Legutolsó frissítés: 2013-08-05 11:36:18

Katalógus ID: 3997

Oldal linkje: <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/pontylazacok/hemigrammus-pulcher.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva