

Hemigrammus rodwayi - Rodway - lazac

ELSŐ LEÍRÓJA:	Durbin, 1909
CSALÁD:	Characidae
MÉRET:	4,5-5 cm
C°:	24-28
pH°:	6-7
Nk°:	0-15
HELYIGÉNY:	80 liter
VISELKEDÉS:	rajhal
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	középső-felső
ÉLETTARTAM:	~4-4,5 év
TERM.VÉD.:	nem értékel



Hemigrammus rodwayi

Rodway - lazac
(Durbin, 1909)

TOVÁBBI KÉPEK:

TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Hemigrammus rodwayi – Rodway – lazac elterjedési területe (Map)



Dél-Amerika; Peru, Brazília, Suriname, Guyana

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

Hosszúkás, tipikusan pontylazac-formájú kisméretű rajhal. Teste ezüstösen csillogó szürke, farktövében enyhe sötétebb mintával.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Szigorúan rajban kell tartani, 6-8 egyedet, különben agresszív lesz! Érdekes módon nem félénk, hanem csipkelődössé válik, ha nem kellő mennyiségben tartjuk. Esetenként még a növényleveleket is

megcsipkedheti, amik nagyon puhák, de ez nem a rajtartással van összefüggésben. Dús növényzetet telepíthetünk, legfeljebb a puha hínárokat kerüljük. Rendszeres vízcseréssel és átlagosan jó szűrővel biztosíthatjuk a tiszta vizet számára. Ez kezelhető Tebang-levéllel, égartobozzal is, hogy minél jobb közérzetük legyen. Szívesen pihennek nagyobb növénylevelek alatt. Társításuk megoldható más dél-amerikai hasonló méretű és kaliberű lazacokkal, valamint nem agresszív ragadozó harcsákkal, törpesügérekkel, vitorláshalakkal is. Békésebb gurámmal, razbórákkal, törpe szivárványhalakkal és kisebb csíkfélékkel is megfér társas tartás esetén. Ha rajban tartjuk, akkor nagyon békés hallá válik, és jó közösségi lakó lesz belőle.

Etetése megoldható száraz tápokkal, de néha érdemes kiegészíteni fagyasztott és élő eleségekkel, pláne ívás előtt, hogy kondíciójuk megfelelő legyen.

Ívni csapatban célszerű kitenni, jávai mohát, ikrarácsot használjunk. Lágy és savas vizet állítsunk be. Az ívás megtörténte után az ikrarabló szülőket távolítsuk el, a kishalak jószerével 1 nap alatt kis is kelnek, további 3 nap után már el is úszhatnak. A szájuk túl kicsi még ahhoz ilyenkor, hogy egyből artemiával indítsunk, inkább papucsállatkát, kerekeshérget válasszunk. Pár nap múlva persze már az artemia is mehet. Rendszeres vízcserék mellett hamar növésnek indul az állomány.

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: *Hemigrammus armstrongi*.

Eng: Golden Tetra, Gold Tetra.

Egyéb köznevei: Yaya, Guldtetra, Kiilletetra, Punalyhtytetra, Punapyrstötetra, Pikili, Glanztetra, Goldtetra, Kirschfleckensalmler, Messingsalmler, Ixha, Zwinnik armstronga, Zwinnik zloty, Sardinita, Guldtetra.

KATEGÓRIÁK:

[Pontylazacok](#), [Akváriumi halak](#)

KULCSSZAVAK:

[1909](#), [Characidae](#), [Pontylazacok](#), [Durbin](#), [Hemigrammus rodwayi](#), [Rodway - lazac](#), [Akváriumi halak](#), [akvarisztika](#)

JELLEMZŐK:

[Orinoco](#), [Guyanák](#), [békés rajhal](#), [Andok orsz.](#), [Kelet-Dél-Amerika](#), [Peru](#), [Dél-amerika](#), [félsavas \(6-6.5 pH\)](#), [hőigényes \(25-30 °C\)](#), [normál \(6.5-7.5 pH\)](#), [igenlágymvízi \(0-5°Nk\)](#), [lágymvízi \(5-10 Nk°\)](#), [Amazónia](#), [Amerika](#), [közepes hőigényű 20-25°C](#), [közepesen keményvízi 10-15°Nk](#), [közepesméretű akvárium 50-100 literig](#), [közepesen áramló vízi](#), [lassan mozgó vízi](#), [közepesen aktív mozgású](#), [mindenevő](#), [középső szint](#), [felső szint](#), [átlagos élethossza 3-6 év](#), [sűrű növényzetigényű](#), [nagy méretű 10-20 cm](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Írta: Liziczai Márk

Katalógusba került: 2012-09-22 09:01:17

Legutolsó frissítés: 2015-08-07 06:37:18

Katalógus ID: 4458

Oldal linkje: <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/pontylazacok/hemigrammus-rodwayi.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva