

Herichthys carpintis - Texasi sügér

| | |
|----------------------|--|
| ELSŐ LEÍRÓJA: | Jordan, 1899 |
| CSALÁD: | Cichlidae |
| MÉRET: | 30 cm |
| C°: | 23,0-33,0 |
| pH°: | 7,0-8,0 |
| Nk°: | 9,0-20 |
| HELYIGÉNY: | 370 liter |
| VISELKEDÉS: | nem társas, harcias, területvédő |
| TÁPLÁLÉK: | ragadozó, mindenevő |
| TARTÓZKODIK? | összes szint |
| ÉLETTARTAM: | 5-8 év |
| TERM.VÉD.: | nem értékelt |



Herichthys carpintis

Texasi sügér
(Jordan, 1899)

TOVÁBBI KÉPEK:



TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Térkép még nem készült az adatlaphoz, feltöltése folyamatban!

Észak-Mexikó és Texas folyói.

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

A test közepesen magas, jellegzetes bölcsőszájú hal forma. Oldalait és fejét igen jellegzetes barnás-vörös alapon kékesen irizáló foltok borítják. A faroknyélen és a test geometriai közepén sötét foltokat láthatunk. A középponti folt néhányszor halványabban ismétlődik a farok irányában. Úszói áttetszőek, kékesen irizáló gyöngy-mintával díszítettek. A hátúszó zászlós, szegélye vörös. Szemgyűrűje arany színű. Az ivarak nehezen megkülönböztethetőek.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Ezt a sügeret közös medencében csak más közel azonos méretű halakkal lehet tartani. Nagy mozgásigényű, sok szabad területet tartunk fenn számára. Sokat turkál a talajban, így nagyon megnehezíti növények tartását akváriumában. Helyezzünk el sok faágat és gyökeret, hogy sok búvóhelye legyen. Tápláló élelemmel takarmányozhatjuk, mint például a marha-szív és a kagyló. Tenyésztése meglehetősen egyszerű. Rengeteg ikrát raknak egy gondosan megtisztított helyre. 4 nap múlva kelnek ki a lárvák, majd további 4-6 nappal később az ivadék szabadon úszik. Artemia naupliusszal és finomra tört szárazeleccsel könnyen felnevelhetőek. Mindkét szülő igen intenzíven törődik utódaival.

Territoriális és nagy termetű. Egy 350-450 literes medencében társíthatjuk csak igazán, az alatt maximum csak harcsákkal, de 300 liter alatt nem is célszerű elhelyezni. A kistestű halakat elfogyasztja! Akváiumi környezetét átrendezi, erős szűrést igényel.

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

A fajt a Cichlasoma nembe is szokták sorolni.

syn: *Neotroplus carpintis*, *Cichlasoma carpintis*, *Cichlasoma laurae*.

Eng: Carpinte Cichlid, Lowland Cichlid, Green Texas Cichlid, Pearlscale Cichlid.

Egyéb köznevei: Escondido, Texasinkirjoahven, Perlcichlide, Mojarra tampiquena.

KATEGÓRIÁK:

[Amerikai fajok](#), [Akváriumi halak](#), [Bölcsőszájú halak](#)

KULCSSZAVAK:

[Cichlidae](#), [Amerikai bölcsőszájúhalak](#), [Herichthys carpintis](#), [Jordan](#), [Texasi sügér](#), [Akváriumi halak](#), [akvarisztika](#), [1899](#)

JELLEMZŐK:

[Közép-Amerika](#), [lágyvízi \(5-10 Nk°\)](#), [keményvízi 15-20°Nk](#), [trópusi](#), [összeférhetetlen viselkedés](#), [lassú mozgású](#), [közepes hőigényű 20-25°C](#), [nagyon melegigényes 30°C felett](#), [ragadozó](#), [átlátszó vízi](#), [barna vízi](#), [közepesen keményvízi 10-15°Nk](#), [ÉA-trópusi](#), [közepesen áramló vízi](#), [Észak-Amerika](#), [nagy \(több 200 liternél\)](#), [lassan mozgó vízi](#), [hosszú életű 6 év fölött](#), [féllúgos \(7.5-8 pH\)](#), [közepesen aktív mozgású](#), [gyér növényzetigényű](#), [hőigényes \(25-30 °C\)](#), [mindenevő](#), [óriás méretű 20 cm fölött](#), [normál \(6.5-7.5 pH\)](#), [középső szint](#), [növényt nem igényel](#), [Amerika](#), [alsó szint](#), [felső szint](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Írta: Honffy Gábor

Katalógusba került: 2008-05-14 09:01:16

Legutolsó frissítés: 2013-11-11 12:39:30

Katalógus ID: 4193

Oldal linkje: https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/bolcsoszaju_halak/amerikai-fajok/herichthys-carpintis.html

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva