

## Herichthys carpintis - Texasi sügér

ELSŐ LEÍRÓJA:	Jordan, 1899
CSALÁD:	Cichlidae
MÉRET:	30 cm
C°:	23,0-33,0
pH°:	7,0-8,0
Nk°:	9,0-20
HELYIGÉNY:	370 liter
VISELKEDÉS:	nem társas, harcias, területvédő
TÁPLÁLÉK:	ragadozó, mindenevő
TARTÓZKODIK?	összes szint
ÉLETTARTAM:	5-8 év
TERM.VÉD.:	nem értékelt



**Herichthys carpintis**  
*Texasi sügér*  
(Jordan, 1899)

### TOVÁBBI KÉPEK:



### TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Térkép még nem készült az adatlaphoz, feltöltése folyamatban!

Észak-Mexikó és Texas folyói.

### KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

A test közepesen magas, jellegzetes bölcsőszájú hal forma. Oldalait és fejét igen jellegzetes barnás-vörös alapon kékesen irizáló foltok borítják. A faroknyélen és a test geometriai közepén sötét foltokat láthatunk. A középponti folt néhányszor halványabban ismétlődik a farok irányában. Úszói áttetszőek, kékesen irizáló gyöngy-mintával díszítettek. A hátúszó zászlós, szegélye vörös. Szemgyűrűje arany színű. Az ivarak nehezen megkülönböztethetőek.

### TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Ezt a sügeret közös medencében csak más közel azonos méretű halakkal lehet tartani. Nagy mozgásigényű, sok szabad területet tartunk fenn számára. Sokat turkál a talajban, így nagyon megnehezíti növények tartását akváriumában. Helyezzünk el sok faágat és gyökeret, hogy sok búvóhelye legyen. Tápláló élelemmel takarmányozhatjuk, mint például a marha-szív és a kagyló. Tenyésztése meglehetősen egyszerű. Rengeteg ikrát raknak egy gondosan megtisztított helyre. 4 nap múlva kelnek ki a lárvák, majd további 4-6 nappal később az ivadék szabadon úszik. Artemia naupliusszal és finomra tört szárazeleléssel könnyen felnevelhetőek. Mindkét szülő igen intenzíven törődik utódaival.

Territoriális és nagy termetű. Egy 350-450 literes medencében társíthatjuk csak igazán, az alatt maximum csak harcsákkal, de 300 liter alatt nem is célszerű elhelyezni. A kistestű halakat elfogyasztja! Akvárium környezetét átrendezi, erős szűrést igényel.

## EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

A fajt a Cichlasoma nembe is szokták sorolni.

**syn:** *Neotroplus carpintis*, *Cichlasoma carpintis*, *Cichlasoma laurae*.

**Eng:** Carpinte Cichlid, Lowland Cichlid, Green Texas Cichlid, Pearlscale Cichlid.

**Egyéb köznevei:** Escondido, Texasinkirjoahven, Perlcichlide, Mojarra tampiquena.

## KATEGÓRIÁK:

[Amerikai fajok](#), [Akváriumi halak](#), [Bölcsőszájú halak](#)

## KULCSSZAVAK:

[Herichthys carpintis](#), [Jordan](#), [Texasi sügér](#), [Akváriumi halak](#), [akvarisztika](#), [1899](#), [Cichlidae](#), [Amerikai bölcsőszájúhalak](#)

## JELLEMZŐK:

[közepes hőigényű 20-25°C](#), [nagyon melegigényes 30°C felett](#), [ragadozó](#), [átlátszó vízi](#), [barna vízi](#), [közepesen keményvízi 10-15°Nk](#), [ÉA-trópusi](#), [közepesen áramló vízi](#), [Észak-Amerika](#), [nagy \(több 200 liternél\)](#), [lassan mozgó vízi](#), [hosszú életű 6 év fölött](#), [féllúgos \(7.5-8 pH\)](#), [közepesen aktív mozgású](#), [gyér növényzetigényű](#), [hőigényes \(25-30 °C\)](#), [mindenevő](#), [óriás méretű 20 cm fölött](#), [normál \(6.5-7.5 pH\)](#), [középső szint](#), [növényt nem igényel](#), [Amerika](#), [alsó szint](#), [felső szint](#), [Közép-Amerika](#), [lággyvízi \(5-10 Nk°\)](#), [keményvízi 15-20°Nk](#), [trópusi](#), [összeférhetetlen viselkedés](#), [lassú mozgású](#).

## FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

**Írta:** Honffy Gábor

**Katalógusba került:** 2008-05-14 09:01:16

**Legutolsó frissítés:** 2013-11-11 12:39:30

**Katalógus ID:** 4193

**Oldal linkje:** [https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/bolcsoszaju\\_halak/amerikai-fajok/herichthys-carpintis.html](https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/bolcsoszaju_halak/amerikai-fajok/herichthys-carpintis.html)

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva