

Hyphessobrycon columbianus - Kolumbiai lazac

ELSŐ LEÍRÓJA:	Zarske, 2002
CSALÁD:	Characidae
MÉRET:	6-8 cm
C°:	23,0-28,0
pH°:	5,0-7,0
Nk°:	3,0-12
HELYIGÉNY:	120 liter
VISELKEDÉS:	békés, csapathal
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	alsó- és középsőszint
ÉLETTARTAM:	5-12 év
TERM.VÉD.:	nem értékelt



Hyphessobrycon columbianus

Kolumbiai lazac

(Zarske, 2002)

TOVÁBBI KÉPEK:

TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Hyphessobrycon columbianus – Kolumbiai lazac elterjedési területe (Map)



Dél-Amerika, Kolumbia; A Rio Acandí vízrendszerében található lassú folyású patakok, mellékágak és holtágak.

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

A kolumbiai lazac teste viszonylag magas felépítésű, oldalait barnás-szürke alapon ezüstös pikkelyek borítják, melyek az oldalon fölött kékesen irizálnak. A jól ételmezett hal úszói élénk pirosak, kivéve a hátúszót, amely narancsos árnyalatú. A szemgyűrű ezüstös fényű.

Az ivarérett hímek hátúszója kissé megnyúlt, és a testük a nőstényeknél karcsúbb.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Elég jól alkalmazkodik akváriumi körülményekhez, a tapasztalatok szerint szereti a jól benövényesedett, folyami homok altalajú, egy-két uszadékfával (vagy ha az nincs, akkor gyökerek is megfelelnek) díszített tartómedencét. A vizet szűrjük át tőzegen, és hogy minél otthonosabban érezzék magukat szűrjünk a talajra még egy-két marék száraz bükk- vagy tölgyfalevelet is. Ezeket néhány hetente cseréljük le a víz elromlásának megelőzése miatt, de a tea-szerű víz nagyon jó hatással lesz halaink közérzetére. A világítást egy kissé kevésbé intenzívre állítsuk be. Természetes élőhelyén elég kevés növény él, de mint már említettem akváriumban nyugodtan használhatjuk az ebből a biotópból származó, kis fényigényű fajokat. Az akvárium berendezésekor hagyjunk számára elegendő úszóteret, hiszen, mint nemzetsége legtöbb tagja, a kolumbia lazac is kiváló úszó.

A kolumbia lazac igazi rajhal, csak csapatban tartsuk, melynek minimális létszáma 6-8 fő. Társhalaknak bátran ajánlhatók a *Corydorasok*, törpesügérfélék, egyéb pontylazacok, páncélosharcsák, algázók, szivárványhalak, vagy bármilyen nyugodt habitusú, nem túl nagy méretű hal.

Élelmezését illetően előnyben részesíti a gerinctelen élőlelőeséget, leginkább a planktonikus szervezeteket, de akváriumi körülmények között gond nélkül tartható lemezes- vagy granulált dízshaltápon, fagyasztott táplálékon. Színei intenzitását planktonok etetésével tarthatjuk meg.

Tenyéztése hasonlít a többi pontylazacéhoz. A jól tartott állomány a közös akváriumban is gyakran ívik, de itt az ivadék megmaradási esélye kicsi. Ha nagyobb létszámú utódcsoportot szeretnénk, töltsünk fel egy 45x25x25 cm-es medencét tőzegen átszűrt 5,5 pH^o-jú, 1-5 Nk^o-ú 28-30 C^o-ú vízzel, az aljára helyezzünk ikrarácsot, és valamilyen ívatónövényt (forrásmohát vagy mesterségeset). A víz szűréséről egy kisebb méretű szivacs-szűrővel gondoskodjunk. Ívatni lehet csapatosan vagy párosan. Ha a csapatosat választjuk, helyezzünk ki mindkét nemből 6-7 jól táplált, szép színezetű példányt. Ha páros technikát választjuk célszerű a nemeket külön tartva kondicionálni. Válasszuk ki a legteltebb nőtényt és a legszebb színű hímet, és az esti órákban helyezzük át őket a szaporítómedencébe. Másnap reggel az ívás általában megtörténik. Az ikrák és a zsenge ivadék érzékenyek az erős fényre, ezért takarjuk le őket.

A nőtényenkénti 100-400 ikrából 24-36 óra múlva kelnek ki a lárvák, majd további 3-4 nap múlva úsznak el. Eleinte kisebb méretű kerekeshérgéket fogyasztanak, majd ha már elég nagyok adhatunk *Artemia naupliust*, grindálférget is. Színesedni nagyjából 2 cm-es korukban kezdenek.

Összességében nem igényes, kezdőknek kiválóan alkalmas, javasolt faj!!

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: -.

Eng: Colombian Tetra, Blue Flame Tetra.

Egyéb köznevei: Kolumbianische Tetra, Blau-rot kolumbianischen Tetra, Tétra de Colombie, Safiiritetra.

KATEGÓRIÁK:

[Pontylazacok](#), [Akváriumi halak](#)

KULCSSZAVAK:

[Characidae](#), [Akváriumi halak](#), [Pontylazacok](#), [akvarisztika](#), [2002](#), [Hyphessobrycon columbianus](#), [Kolumbiai lazac](#), [Zarske](#)

JELLEMZŐK:

[Andok orsz.](#), [savas \(6pH alatt\)](#), [mindenevő](#), [alsó szint](#), [középső szint](#), [igenlágvyvízi \(0-5°Nk\)](#), [átlagos élethossza 3-6 év](#), [Ecuad.-Kol.](#), [Amerika](#), [lágvyvízi \(5-10 Nk°\)](#), [átlagos növényzetigényű](#), [közepes méretű 5-10 cm](#), [normálméretű akvárium 100-200 literig](#), [közepes hőigényű 20-25°C](#), [barna vízi](#), [átlászó vízi](#), [Dél-amerika](#), [közepesen keményvízi 10-15°Nk](#), [békés rajhal](#), [félsavas \(6-6.5 pH\)](#), [közepesen áramló vízi](#), [hosszú életű 6 év fölött](#), [hőigényes \(25-30 °C\)](#), [lassan mozgó vízi](#), [gyér növényzetigényű](#), [normál \(6.5-7.5 pH\)](#), [közepesen aktív mozgású](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Írta: Honffy Gábor

Katalógusba került: 2010-12-31 09:01:17

Legutolsó frissítés: 2013-08-05 11:57:12

Katalógus ID: 4327

Oldal linkje: <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/pontylazacok/hyphessobrycon-columbianus.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva