

Hyphessobrycon erythrostigma - Vörösfolttú pontylazac

| | |
|---------------|--------------|
| ELSŐ LEÍRÓJA: | Fowler, 1943 |
| CSALÁD: | Characidae |
| MÉRET: | 6-8 cm |
| C°: | 22,0-24,0 |
| pH°: | 6,0-7,0 |
| Nk°: | 0-18 |
| HELYIGÉNY: | 120 liter |
| VISELKEDÉS: | békés |
| TÁPLÁLÉK: | mindenevő |
| TARTÓZKODIK? | összes szint |
| ÉLETTARTAM: | 3-5 év |
| TERM.VÉD.: | nem értékelt |



Hyphessobrycon erythrostigma

Vörösfolttú pontylazac

(Fowler, 1943)

TOVÁBBI KÉPEK:



TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Hyphessobrycon erythrostigma – Vörösfolttú pontylazac elterjedési területe

(Map)

Kolumbia patakjai és folyói.

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

Teste magas és mély. Alapszíne ezüstös rózsaszín, feltűnő jellegzetessége az oldalán, a hátúszó alatt elhelyezkedő rózsaszínes vörös folt. A hímek hátúszója nagy, sarló alakú; a nőstényeké kisebb és kerekesebb. Mindkét ivar farok alatti úszója hosszú alapon nyugszik; a hímeké kissé homorú szélű.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Nagyon békés, igazi társasakváriumi hal. Szereti a viszonylag tágas, sok növényvel beültetett, de azért

elegendő kiúszótérrel rendelkező, gyökerekkel, ágakkal berendezett, viszonylag árnyas akváriumot. Bármely kisebb-nagyobb békés halfajjal együtt tartható. Ilyenek pl. más pontylazacok, törpesügerek, harcsák, *Otocinclus*, *Corydorasok*. Nagyon ajánlatos nagyobb csapatot tartani belőlük (legalább 6-8 fő), mert így kevésbé lesznek félénkek. Előnyös, ha vizüket tőzegen át szűrjük meg.

Élelmezésük semmiféle problémát nem jelent: a legtöbb kisméretű élő- és fagyasztott táplálékot, száraz eledelt szívesen fogyasztja, de ne feledjük, hogy változatos étrenddel érhetjük el azt, hogy legjobb formájukat és színeiket mutassák számunkra.

Tenyésztéséhez vegyünk egy kis méretű (30X20X20 cm) akváriumot, melyet feltöltünk 2-5°Nk-ú lágy, tőzeges 5,5-6,0 °pH-s, 27-28°C-os vízzel. Ívató növénynek helyezünk el egy nagy csomó jáva-mohát vagy más finom-levelű növényt. A nagyon minimális megvilágítású helyen lévő szaporítótartályba telepítsünk egy szivacsűrőt. Célszerű a tenyészhalakat egy külön számukra fenntartott akváriumban kondicionálni. Az ebben az akváriumban legszebb színű hímeket, és legikrásabb nőtényt telepítsük át a szaporítómedencébe. Elég sok idő eltelhet az ívásig, ezért kénytelenek lehetünk élő planktonnal etetni a szülőket, nehogy éhségükben az esetleg növények közé szórt ikrákat felfalják. Sajnos valamilyen ok miatt a nőtények nem mindig érdeklődnek a hím iránt. Ilyenkor próbálkozzunk másik párral. Amint észrevesszük az ikrákat, a párt halásszuk ki.

Az ikrákból a lárvák kb. 24 óra múlva kikelnek, majd további 2-3 nap múlva úsznak el. Amikor szikzacskójuk teljesen felszívódott megkezdhetjük táplálásukat apró eleséggel, például *Cyclops* naupliuszaival, papucsállatkákkal, ivadéknevelő poreleséggel. Ha már megfelelően nagyok átállhatunk *Artemia* naupliuszai vagy mikró etetésére. Az

Bár néha lehetséges, összességében a legnehezebben tenyészthető lazacok egyike!

Évégett sajnos ha kapható, akkor meglehetősen drága hal, bár színezete egyedülálló!

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: *Hemigrammus erythrostigma*, *Hyphessobrycon rubrostigma*.

Eng: Bleeding heart tetra, Bleeding-heart tetra, Tetra perez.

Egyéb köznevei: Langfinnet blödende hjerte, Bleeding heart, Kirsikkatetra, Fahnen-Kirschflecksalmler, Kirschflecksalmler, Perez Salmler, Bystryk czerwoplamy, Mojarita, Punto rojo, Dolkstyngetetra.

KATEGÓRIÁK:

[Pontylazacok](#), [Akváriumi halak](#)

KULCSSZAVAK:

[Pontylazacok](#), [akvarisztika](#), [1943](#), [Hyphessobrycon erythrostigma](#), [Vörösfoltú pontylazac](#), [Fowler](#), [Characidae](#), [Akváriumi halak](#)

JELLEMZŐK:

[középső szint](#), [felső szint](#), [Amerika](#), [átlagos élethossza 3-6 év](#), [Ecuad.-Kol.](#), [közepes méretű 5-10 cm](#), [átlagos növényzetigényű](#), [közepes hőigényű 20-25°C](#), [keményvízi 15-20°Nk](#), [átlátszó vízi](#), [normálméretű akvárium 100-200 literig](#), [félsavas \(6-6.5 pH\)](#), [közepesen keményvízi 10-15°Nk](#), [barna vízi](#), [normál \(6.5-7.5 pH\)](#), [közepesen áramló vízi](#), [békés rajhal](#), [alsó szint](#), [lassan mozgó vízi](#), [igenlágyművi \(0-5°Nk\)](#), [közepesen aktív mozgású](#), [Andok orsz.](#), [lágyművi \(5-10 Nk°\)](#), [mindenevő](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Írta: Honffy Gábor

Katalógusba került: 2008-05-12 09:01:16

Legutolsó frissítés: 2015-08-19 21:20:02

Katalógus ID: 3999

Oldal linkje: <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/pontylazacok/hyphessobrycon-erythrostigma.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva