

Hyphessobrycon megalopterus - Fekete fantomlazac

ELSŐ LEÍRÓJA:	Eigenmann, 1915
CSALÁD:	Characidae
MÉRET:	5 cm
C°:	22,0-28,0
pH°:	6.0-7.5
Nk°:	6,0-18
HELYIGÉNY:	65 liter
VISELKEDÉS:	békés
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	összes szint
ÉLETTARTAM:	5-8 év
TERM.VÉD.:	



Hyphessobrycon megalopterus
Fekete fantomlazac
 (Eigenmann, 1915)

TOVÁBBI KÉPEK:

Képek feltöltés alatt!

TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Hyphessobrycon megalopterus – Fekete fantomlazac elterjedési területe
 (Map)

Felső-Paraguay, Bolívia és a braziliai *Guaporé* folyó vízgyűjtője.

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

A fekete fantomlazac áttetsző teste szürkés-ezüst színű, válla környékén feltűnő sötét folttal. A szem szivárványhártyáját arany gyűrű övezi. Szokatlan, hogy e faj nőstényeinek a zsírúszója élénkebb vörös, mint a hímeké.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

A fekete fantomlazac békés, jól beilleszkedő tagja közösségi, vagy biotóp akváriumainknak. Minimum 6 fős társaságot tartunk belőlük. Elvan csapvízben is, de ahhoz, hogy igazán jól érezze magát, és elő jöjjön gyönyörű sötét színe ajánlatos kissé lágú, savas jellegű vízben tartani. Ezentúl kedveli a viszonylagos félhomályt, és a sok növényt, amelyek sűrűjében a hím naphosszat pihenget, leselkedik, hogy egyszer csak rajtaütés szerűen előrontva a többiekkel rivalizáljon, vagy egy nőténynek udvaroljon.

Élelmezése nem okoz különösebb fejtörést, szívesen fogyaszt bármilyen élő eleséget, vagy jó minőségű száraz tápot.

Fogságban való szaporítása nem nehéz, a szülők általában nem veszélyesek az ikrákra, amelyek fényérzékenyek és a szétesésre is kissé hajlamosak. Tenyésztésükhöz egy kis méretű (6-8 literes) medencét töltünk fel kb. 15 cm magasságig 5-6 °pH-jú, nagyon lágú(1-4°Nk), tőzegen átszűrt 26-28°C-os vízzel. Helyezzünk bele finom-szálú ívató növényt, kis szivacsűrőt, és fény elől takarjuk le. Az élőeleségen kondicionált szülőpár rendszerint másnap vagy harmadnap ikrázik, miután is eltávolítjuk őket a medencéből. Egy ikrázás eredménye akár 300 ikra is lehet, melyek 28-30 óra után kelnek ki, és további 4 nap múltán úsznak el. Az ivadék első elesége lehet *Artemia* (sórák) frissen kelt naupliusza, rotatoria vagy mesterséges ivadéktáp. A növekedésük nem túl gyors, ezért más ivadékoktól elkülönítve neveljük őket. Egy 200 fős csapat felnevelése jó eredménynek számít.

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: *Megalamphodus megalopterus*, *Megalamphodus rogoaguae*.

Eng: Black phantom tetra, Phantom tetra.

Egyéb köznevei: Sort fantom, Sort Fantomtetra, Musta-aavetetra, Phantomsalmler, Schwarzer Phantomsalmler, Barwieniec czarny, Tetra fantasma negro, Fantomtetra.

KATEGÓRIÁK:

[Pontylazacok](#), [Akváriumi halak](#)

KULCSSZAVAK:

[Hyphessobrycon megalopterus](#), [Eigenmann](#), [Akváriumi halak](#), [Characidae](#), [akvarisztika](#), [Pontylazacok](#), [1915](#), [Fekete fantomlazac](#)

JELLEMZŐK:

[barna vízi](#), [közepesen áramló vízi](#), [Dél-amerika](#), [félsavas \(6-6.5 pH\)](#), [lassan mozgó vízi](#), [hőigényes \(25-30 °C\)](#), [közepesen aktív mozgású](#), [békés rajhal](#), [normál \(6.5-7.5 pH\)](#), [mindenevő](#), [alsó szint](#), [középső szint](#), [Kelet-Dél-Amerika](#), [Amerika](#), [lágynyí \(5-10 Nk°\)](#), [felső szint](#), [közepes méretű 5-10 cm](#), [átlagos élethossza 3-6 év](#), [Paraguay](#), [közepes hőigényű 20-25°C](#), [keményvízi 15-20°Nk](#), [átlászó vízi](#), [sűrű növényzetigényű](#), [Bolívia](#), [közepesen keményvízi 10-15°Nk](#), [Amazónia](#), [közepesméretű akvárium 50-100 literig](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Írta: Honffy Gábor

Katalógusba került: 2008-05-12 09:01:16

Legutolsó frissítés: 2013-08-06 05:27:12

Katalógus ID: 4007

Oldal linkje: <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/pontylazacok/hyphessobrycon-megalopterus.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva