Hyphessobrycon pulchripinnis - Citromlazac

ELSŐ LEÍRÓJA:	Ahl, 1937
CSALÁD:	Characidae
MÉRET:	5 cm
C°:	22,0-24,0
pH°:	6,0-7,0
Nk°:	2,0-15
HELYIGÉNY:	70 liter
VISELKEDÉS:	békés
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	összes szint
ÉLETTARTAM:	3-8 év
TERM.VÉD.:	nem értékelt



Hyphessobrycon pulchripinnis
Citromlazac
(Ahl, 1937)

TOVÁBBI KÉPEK:





TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Hyphessobrycon pulchripinnis – Citromlazac elterjedési területe (Map)

Az Amazonas-medence folyói. Pará környéke.

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

A test csupán mérsékelten nyújtott, a hím valamivel karcsúbb, mint a magasabb hátú nőstény. A test színe zöldessárga, a hasoldal ezüstös. Az érett hímek színei élénkebbek. Ívegesen átlátszó, ugyanakkor zöldesszürke-ezüstös fényű, olykor szép sárga csillogás is látszik. A fark alatti úszó első sugarainak a szegélye élénk sárga és fekete színű. A szivárványhártya felső fele vérvörös.

A nemek megkülönböztetése egyszerű: a hímek hasvonala egyenes, a nőstények ugyanott gömbölyűek. Áttetsző fényben jól láthatóak a nőstény ikrái.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Társas hajlamú, békés és igénytelen, de nem egykönnyen tenyészthető. Hasonló méretű halakkal gond nélkül együtt tartható, legkevesebb 6 példányt vásároljunk, mert igazi rajhal. Színei igazán sötét tónusú altalaj felett érvényesülnek. Kissé mozgékony hal, és ha nincsen rajban, meglehetősen csipkelődős, szekálódós hallá válik!

Szereti a közepesen kemény vizet (8-12°Nk), de sima csapvízben is elvan. Eléggé oxigénigényes, ezért ne tartsuk túl zsúfolt, nem jól szellőztetett akváriumban. Hőmérséklet tekintetében elegendő számára a 22-24°C, melegebb vízben nem is érzi jól magát.

Etetésük nem jelenthet problémát, kedvelik a tubifexet, szúnyoglárvát, kisebb méretű plankton szervezeteket de a jó minőségű száraz eleséget is elfogadják. Ha tenyészteni szeretnénk őket ajánlatos egy héten legalább kétszer vízibolhával etetni, mert így elkerülhető a petefészek elzsírosodása.

A tenyésztést elsősorban az nehezíti, hogy nem minden pár illik össze. A teljes íváserettség időpontját nem szabad eltéveszteni. A peték nem csökevényesednek el, s könnyen következik be ikrakeményedés.

A szaporításukhoz szükségünk lesz egy kb. 15 literes medencére melyet feltöltünk nagyon lágy (1-2°Nk) tőzegen átszűrt, vagy tőzeg-kivonattal savanyított 6,8 °pH-s vízzel. Az aljzatra terítsünk szét egyenletesen forrásmohát, vagy ha az nem áll rendelkezésünkre, akkor alkalmazzunk ikrarácsot és perlonvatta csomókat. Az elővigyázatosság szükséges, mert a citromlazac ikrafaló. Ezenkívül nagyon fontos a víz magas oxigéntartalma, mert a szülők és a kishalak is nagyon oxigénigényesek, ezt finom porlasztású levegőztető behelyezésével oldhatjuk meg, a legjobb szivacsszűrővel kombinálni. Az esti órákban kihelyezett hím mellé egy vagy két nőstényt is párosíthatunk, de túlzott módon kergetődző hímeket ne fogjunk be a tenyésztésbe. A víz hőmérsékletét 25°C-ról fokozatosan emeljük 27-28°C-ig. Az akváriumot takarással óvjuk az erős fénytől, ha ezt elmulasztjuk megtenni, előfordulhat, hogy az ívás el is marad. A jól kondicionált, összeillő tenyészállatok már másnap reggel, de általában a második nap reggelén ívnak le. Ívás után a szülőket távolítsuk el, a medence takarását ha lehet, még fokozzuk. A lárvák 24 óra múlva kelnek ki, majd további 3-4 nap múlva úsznak el. Első táplálléknak megfelel a *Cyclops* naupliusz, papucsállatka, vagy púderfinomságú speciális ivadéknevelő műeleség. 1-2 nap alatt annyit nőnek, hogy le tudják vadászni a sórák (*Artemia*) frissen kelt naupliuszait is. Az ivadékot erős fényhez csak fokozatosan szoktassuk át. Növekedési ütemük gyors, 2 hónapos korukban színesednek, 6-8 hónapos korban már ivarérettek lesznek.

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: -.

Eng: Lemon tetra.

Egyéb köznevei: Citrontetra, Sitruunatetra, Schönflossensalmler, Zitronensalmler, Bystrzyk pieknopletwy, Pul'khripinnis, Citrontetra.

KATEGÓRIÁK:

Pontylazacok, Akváriumi halak

KULCSSZAVAK:

Citromlazac, Hyphessobrycon pulchripinnis, Akváriumi halak, Characidae, akvarisztika, Pontylazacok, 1937, Ahl

JELLEMZŐK:

nagyméretű 10-20 cm, közepesméretű akvárium 50-100 literig, Amazónia, közepesen áramló vízi, barna vízi, félsavas (6-6.5 pH), lassan mozgó vízi, Dél-amerika, normál (6.5-7.5 pH), közepesen aktív mozgású, békés rajhal, alsó szint, mindenevő, hosszú életű 6 év fölött, igenlágyvízi (0-5°Nk), középső szint, lágyvízi (5-10 Nk°), felső szint, Kelet-Dél-Amerika, Amerika, átlagos élethossza 3-6 év, közepes hőigényű 20-25°C, átlagos növényzetigényű, átlátszó vízi, sűrű növényzetigényű, közepesen keményvízi 10-15°Nk.

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Írta: Honffy Gábor
Katalógusba került: 2008-05-12 09:01:16
Legutolsó frissítés: 2013-08-06 05:29:30
Katalógus ID: 4004
Oldal linkje: https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/pontylazacok/hyphessobrycon-pulchripinnis.html

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva