

Hyphessobrycon eques - Serpalazac

ELSŐ LEÍRÓJA:	Steindachner, 1882
CSALÁD:	Characidae
MÉRET:	5 cm
C°:	22,0-26,0
pH°:	5.0-7.8
Nk°:	10,0-25
HELYIGÉNY:	85 liter
VISELKEDÉS:	békés, csapathal
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	felső- és középső szint
ÉLETTARTAM:	5-8 év
TERM.VÉD.:	nem értékel



Hyphessobrycon eques
Serpalazac
(Steindachner, 1882)

TOVÁBBI KÉPEK:

TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:

Képek feltöltés alatt!



Hyphessobrycon eques – Serpalazac elterjedési területe (Map)

Guyana és az, Amazonas-medence.

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

Vérvörös alapszíne a test alsó részén halványabbá fakul. A nőstények válltájékát sötét, vessző alakú folt díszíti. A nőstények többnyire halványabb színűek és testesebbek a hímeknél. A farok-, a has-, zsír- és a farok alatti úszó vörös, az utóbbi szegélye fekete. A hátúszó nagy része fekete.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Ez a faj hasonló színű fajok csoportjában tartozik (*H. callistus*, *H. minor*, *H. haraldschultzei*, *H. hasemani*). A váll foltjának jelenléte, alakja és színe fontos bélyeg.

Békés, biotóp- vagy egyéb társasakváriumokba kiválóan alkalmas. Hőigénye sem magas: már 24 °C-os vízben jól érzi magát. Szereti az árnyas, sok növényvel betelepített, tágas kiúszóterekkel ellátott akváriumot. Mivel tipikus rajhal ajánlatos minimum 6 fős csapatot beszerezni.

Táplálása semmiféle gondot nem okoz: elfogad mindenféle élőeleséget (planktonikustól a tubifexig), valamint a fagyasztott és jó minőségű száraz eledelt is.

Videó az ívásról

Tenyésztése nem túl nehéz. Szükségünk lesz egy 6-10 liter űrtartalmú akváriumra, melybe talajt vagy ikrarácsot nem kell elhelyezni, hanem sokkal inkább finom szálú élő ívató-növény bokrokat, esetleg egy kis szivacs szűrőt. A műnövény nem túl alkalmas (még a perlonvatta sem), mert ezeken ívás közben könnyen fennakadhat. A víz paraméterei: lágy (4-8°Nk), neutrális vagy enyhén savanyú (6,7-7,0°pH), 26-28°C hőmérsékletű. A megvilágítást inkább mellőzzük, vagy csak egészen minimális legyen. A kitűnően kondicionált (lehetőleg sok élőeleséggel etetett) pár kihelyezésük utáni második vagy harmadik napon ívik. Az enyhén ragadós, halványbarna ikrák nagyrészt megtapadnak a finom szálú növényzeten. Ívás után a szülőket távolítsuk el.

Az ikrák száma a 300 darabot is elérheti. A lárvák 48 óra múlva bújnak ikrahéjukból, és további 2 nap múlva úsznak el. Első étrendjük akár sórák (*Artemia*) naupliusza is lehet, ha elég apró fajta, de biztosabb Cyclops naupliuszokkal próbálkozni. Az ivadék érzékeny a fényre, ezért takarjuk őket. Megfelelő táplálás mellett 2 hónap múlva elérik 15-20 mm-t, 6-8 hónapos korukban lesznek ivarérettek.

A sok továbbtenyésztés és beltenyésztés miatt a kereskedelembe gyakran látni nem túl szép példányokat is, a régi serpalazac gyakorlatilag már kiveszőben van akváriumainkból. Néha csipkelődhet.

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

Ékszer lazac

syn: *Hyphessobrycon eques*, *Cheirodon eques*., *Chirodon eques*, *Hemigrammus melasopterus*, *Hemigrammus serpae*, *Hyphessobrycon callistus*, *Hyphessobrycon eques*, *Megalamphodus eques*, *Tetragonopterus callistus*.

Eng: Blood characin, Callistus, Callistus tetra, Jewel tetra, Red serpa, Serpa tetra, Serpae tetra.

Egyéb köznevei: Rød serpae Tetra, Pikkutetra, Serpatetra, Serpo, Tétra-joyau, Blutsalmler, Serpasalmler, Bystrzyk barwny, Bystrzyk serpa, Mato grosso, Mato-grosso, Serpas Mojarra.

KATEGÓRIÁK:

[Pontylazacok](#), [Akváriumi halak](#)

KULCSSZAVAK:

[Steindachner](#), [Characidae](#), [Pontylazacok](#), [1882](#), [Hyphessobrycon eques](#), [Akváriumi halak](#), [Serpilazac](#), [akvarisztika](#)

JELLEMZŐK:

[átlagos élethossza 3-6 év](#), [fekete vízi](#), [közepes hőigényű 20-25°C](#), [normál \(6.5-7.5 pH\)](#), [átlagos növényzetigényű](#), [átlátszó vízi](#), [savas \(6pH alatt\)](#), [keményvízi 15-20°Nk](#), [közepesen keményvízi 10-15°Nk](#), [nagy keményvízi \(20-30°Nk\)](#), [Amazónia](#), [Kelet-Dél-Amerika](#), [közepesméretű akvárium 50-100 literig](#), [lágyvízi \(5-10 Nk°\)](#), [barna vízi](#), [közepesen áramló vízi](#), [Dél-amerika](#), [lassan mozgó vízi](#), [sárga vízi](#), [közepesen aktív mozgású](#), [Orinoco](#), [mindenevő](#), [Guyanák](#), [föllúgos \(7.5-8 pH\)](#), [középső szint](#), [békés rajhal](#), [Amerika](#), [félsavas \(6-6.5 pH\)](#), [felső szint](#), [hosszú életű 6 év fölött](#), [közepes méretű 5-10 cm](#), [hőigényes \(25-30 °C\)](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Írta: Honffy Gábor

Katalógusba került: 2008-05-12 09:01:16

Legutolsó frissítés: 2017-03-20 11:40:35

Katalógus ID: 4006

Oldal linkje: <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/pontylazacok/hyphessobrycon-serpae.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva