

Hyphessobrycon sweglesi - Vörös fantomlazac

ELSŐ LEÍRÓJA:	Géry, 1961
CSALÁD:	Characidae
MÉRET:	5 cm
C°:	20,0-24,0
pH°:	5.5-7.5
Nk°:	4,0-20
HELYIGÉNY:	75 liter
VISELKEDÉS:	békés
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	összes szint
ÉLETTARTAM:	5-8 év
TERM.VÉD.:	nem értékelt



Hyphessobrycon sweglesi
Vörös fantomlazac
 (Géry, 1961)

TOVÁBBI KÉPEK:



TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Hyphessobrycon sweglesi – Vörös fantomlazac elterjedési területe (Map)

Orinoco-medence, Dél-Amerika északi részén.

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

Annak ellenére, hogy a fekete és a vörös fantomlazac teljesen elkülönült területről származik, színváltozatként írták le. A vörös fantomlazac testszíne áttetsző vörös, hátúszóján fekete mintázat van (a nőstényének a csúcsa fehér). A jellegzetes hátúszó a hímeken általában jól fejlett, hegyes, de nem olyan nagy, mint a fekete fantomlazacé. A nőstények hátúszója lekerekítettebb. A váll környékén sötét folt van.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

A fekete fantomlazachoz hasonlóan, ez a faj is lágú, savas vízben érzi jól magát. Legalább 6-8 példányt

tartsunk belőle. Akárcsak rokona a fekete fantomlazac, ő is szereti a jól benövényesített, sötétebb jellegű, sok búvóhellyel ellátott lágy, tiszta vizű akváriumot, ahol elegendő kiúszótér is rendelkezésére áll.

Minden élőeséget hálásan fogadnak, de eledelként még szóba jöhetnek a minőségi száraz-tápok is.

Tenyésztése nem egyszerű, mert nehéz összeillő párt találni. Szaporításukhoz vegyünk egy 8-10 literes akváriumot, melyet töltsünk fel kb. 15 cm magasságig lágy (5-6°Nk), tőzegen átszűrt, enyhén savanyú (6-6,5°pH), 22-24°C-os vízzel. Ívató növényként hosszú gyökerű úszónövényt válasszunk. A tartályt fénytől óvjuk.

Az élő eleségen tartott tenyészpárt az esti órákban helyezzük át. Kissé lassan szokják meg az új helyet, így az ívás csak a kihelyezés utáni 2-3 napon megy végbe. Érdekességként megemlíthető, hogy ívás közben a pár gyakran áll fejre. A szülőket az ívás után távolítsuk el.

Az ikrák halványbarna színűek és 28-30 óra múlva kelnek ki, Az ivadék elúszására további 4 nap múlva számíthatunk. Indító eleségként kis méretű élőeséget (rotatoria) adjunk számukra, amíg el nem érik azt a méretet amikor már meg tudják enni az *Artemia* (sórák) naupliusait, vagy a mikrót. 100-150 ivadék felnevelése már szép eredménynek számít. Figyelem: az ikrák és az ivadékok erősen fényérzékenyek, ezért a fénytől védenünk kell őket!

Hűvösebb vizet igényel, 24 C optimális.

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: *Megalamphodus sweglesi*.

Eng: Red phantom tetra, Swegles's tetra.

Egyéb köznevei: Röd fantomtetra, Puna-aavetetra, Puna aavetetra, Roter Phantomsalmler, Barwieniec czerwony, Sardinita, Röd Fantomtetra.

KATEGÓRIÁK:

[Pontylazacok](#), [Akváriumi halak](#)

KULCSSZAVAK:

[1961](#), [Characidae](#), [Géry](#), [Pontylazacok](#), [Hyphessobrycon sweglesi](#), [Vörös fantomlazac](#), [Akváriumi halak](#), [akvarisztika](#)

JELLEMZŐK:

[Dél-amerika](#), [Orinoco](#), [Guyanák](#), [békés rajhal](#), [hosszú életű 6 év fölött](#), [fekete vízi](#), [barna vízi](#), [félsavas \(6-6.5 pH\)](#), [normál \(6.5-7.5 pH\)](#), [savas \(6pH alatt\)](#), [alsó szint](#), [igenlágyművi \(0-5°Nk\)](#), [lágyművi \(5-10 Nk°\)](#), [nagy méretű 10-20 cm](#), [Amerika](#), [közepes hőigényű 20-25°C](#), [átlátszó vízi](#), [közepesen keményvízi](#)

[10-15°Nk](#), [közepesméretű akvárium 50-100 literig](#), [közepesen áramló vízi](#), [lassan mozgó vízi](#), [közepesen aktív mozgású](#), [mindenevő](#), [középső szint](#), [felső szint](#), [átlagos élethossza 3-6 év](#), [átlagos növényzetigényű](#), [keményvízi 15-20°Nk](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Írta: Honffy Gábor

Katalógusba került: 2008-05-12 09:01:16

Legutolsó frissítés: 2015-11-05 09:51:25

Katalógus ID: 4008

Oldal linkje: <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/pontylazacok/hyphessobrycon-sweglesi.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva