

Hypselecara coryphaenoides - Csokoládésügér

ELSŐ LEÍRÓJA:	Heckel, 1840
CSALÁD:	Cichlidae
MÉRET:	18-22 cm
C°:	22,0-30,0
pH°:	5,0-6,0
Nk°:	0,5-5
HELYIGÉNY:	280 liter
VISELKEDÉS:	nem társas
TÁPLÁLÉK:	élő eleség
TARTÓZKODIK?	középső- és alsó szint
ÉLETTARTAM:	5-8 év
TERM.VÉD.:	nem értékelt



Hypselecara coryphaenoides

Csokoládésügér


(Heckel, 1840)

TOVÁBBI KÉPEK:

TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Térkép még nem készült az adatlaphoz, feltöltése folyamatban!



Dél-Amerika, az *Amazonas* vidékén - a *Negro*, *Trombetas*, *Tapajós*, *Maués* és *Uatuma* folyók; helyenként az *Orinoco* folyó felső folyásánál, és az *Aguaro* folyó medencéjében.

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

Alapszíne barnás, a kopolyúfedőkön egy pár sötét vonás, a hátúszó és farkúszó tövén néhány folt látható. Az úszók szürkék, feketés csíkrajzolatúak, a farkúszó fekete szegélyű.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Összeférhetetlen, főként az azonos nemű, fajilag azonos egyedekkel szemben. Más halakkal kifejezett korban, íváskor lehet agresszív. Amúgy fiatalabb korban egész békés. Társíthatjuk közepesebb bölcsőszájúakkal, harcsákkal és nagyobb lazacokkal is! Íváskor ügyeljünk csak territoriális viselkedésére leginkább!

Hőigényes: 25—28°C hőmérséklet a megfelelő. Szaporodáskor óriási gödröket ásnak és rendszerint valamilyen tereptárgyra helyezik el ikráikat - a bölcsőszájú halakra jellemző módon. Ilyenkor a színük csokoládébarnára változik, amely színről nevüket is kapták. Az ívás kb. 90 perc alatt lezajlik, azután az ikrákat a nőstény gondozza, a hím pedig védelmezi őket. Időnként a lárvákat áthelyezik egyik helyről egy másikra (ebben a műveletben a hím is részt vesz). Ha biztosra akarunk menni az ivadék felnevelésében, célszerű a lárvákat elvenni a szülőktől, és az ivatóakvárium vizével megegyező minőségű vízzel feltöltött 20-30 literes akváriumba áthelyezni őket. Ha másképp döntünk, akkor részünk lehet abban az élményben, hogy megfigyelhetjük, hogyan terelgetik a szülők az ivadékokat. Az ivadékok majd csak akkor kerülnek életveszélybe, amikor a nőstény újra íváshoz készülődik, mert ekkor már a hím sem tudja megakadályozni a nőstényt, hogy vadásson utódaira. Az ivadék 7 nap múlva úszik el, Artemia naupliusszal gond nélkül nevelhető fel addig a méretig, amíg már vágott tubifexet, grindált és jó minőségű száraz eleséget is elfogad. Egy ívásból akár 300 fős csapat is felnevelhető.

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

Régebbi neve: Arnold bölcsőszájú hala.

syn: *Centrarchus niger*, *Chuco axelrodi*, *Cichlasoma arnoldi*, *Heros coryphaenoides*, *Heros niger*.

Eng: Chocolate Cichlid, Rio Negro Chocolate Cichlid.

Egyéb köznevei: Chokoladecichlide, Suklaakirjoahven, Großkopfbuntbarsch, Vieja.

KATEGÓRIÁK:

[Amerikai fajok](#), [Akváriumi halak](#), [Bölcsőszájú halak](#)

KULCSSZAVAK:

[1840](#), [Cichlidae](#), [Heckel](#), [Amerikai bölcsőszájúhalak](#), [Csokoládésügér](#), [Hypselecara coryphaenoides](#), [Akváriumi halak](#), [akvarisztika](#)

JELLEMZŐK:

[Amerika](#), [alsó szint](#), [Amazónia](#), [plankton és detrituszfogyasztó](#), [közepes hőigényű 20-25°C](#), [igenlágyvízi \(0-5°Nk\)](#), [barna vízi](#), [átlátszó vízi](#), [összeférhetetlen viselkedés](#), [Dél-amerika](#), [közepesen áramló vízi](#), [lassan mozgó vízi](#), [Orinoco](#), [közepesen aktív mozgású](#), [Guyanák](#), [középső szint](#), [hosszú életű 6 év fölött](#), [nagy \(több 200 liternél\)](#), [átlagos élethossza 3-6 év](#), [fekete vízi](#), [félsavas \(6-6.5 pH\)](#), [lassú mozgású](#), [gyér növényzetigényű](#), [hőigényes \(25-30 °C\)](#), [nagy méretű 10-20 cm](#), [óriás méretű 20 cm fölött](#), [savas \(6pH alatt\)](#), [ragadozó](#), [Kelet-Dél-Amerika](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Írta: Honffy Gábor

Katalógusba került: 2009-10-03 09:01:16

Legutolsó frissítés: 2013-11-11 12:53:15

Katalógus ID: 4195

Oldal linkje: https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/bolcsoszaju_halak/amerikai-fajok/hypselecara-coryphaenoides.html

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva