

Hypselecara temporalis - Smaragdsügér

ELSŐ LEÍRÓJA:	Günther, 1862
CSALÁD:	Cichlidae
MÉRET:	30 cm
C°:	25,0-30,0
pH°:	5,0-7,5
Nk°:	3,0-18
HELYIGÉNY:	370 liter
VISELKEDÉS:	territoriális
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	összes szint
ÉLETTARTAM:	5-8 év
TERM.VÉD.:	nem értékel



Hypselecara temporalis
Smaragdsügér
(Günther, 1862)

TOVÁBBI KÉPEK:

TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Térkép még nem készült az adatlaphoz, feltöltése folyamatban!



Az Amazonas-vidék és Guayana nagyobb vizeiben.

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

Oldalról lapított. Fiatalon meglehetősen nyurga, idősebb korában azonban egyre magasabb hátúvá válik. Előreugró homlokduzzanatot visel. 30 cm hosszúra nő. Fiatal korában háta moha- vagy smaragdzöld. Két oldala és feje rozsdavagy téglavörös, Idősebb korban ez a színezet szinte teljesen kiszorítja a zöld árnyalatokat. A faroktőltől a fejig keskeny, fekete, hosszanti csík húzódik, ez azonban hiányozhat is. A faroktővön és testközépen két — többé-kevésbé határozott — fekete folt látható. Az ik csekélyek, a nőstény ivarszemölcsöke iváskor valamivel nagyobb, mint hímé.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Tartása és tenyésztése a gödörben költő bölcsőszájú halakéval azonos. Robusztus, szép színezetű faj, nagy medencék szükségesek hozzá. Együtt tartható más bölcsőszájú halakkal. Hőmérsékleti igénye: 24-27 °C. Tenyésztésre nem nehéz. A 400-800 db. ikra lerakása és a megtermékenyítése egy lapos kőn történik, lehetőleg a vízfelszínhez közel. 3 nap után kikelnek az ikrák és a szülők az ivadékokat áthelyezik egy gödörbe. További 6 nappal később a fiatal halak szabadon úsznak. Artemia-naupliusszal könnyen felnevelhetők.

Kissé agresszív lehet, territoriális. De ha kellő méretű medencében helyezzük el, könnyen társíthatjuk más robusztus nagytetű fajokkal (harcsák, lazacok, pontyfélék, sügerek)! Erős szűrésre ügyeljünk! Medencéjét dekoráljuk ágakkal, kövekkel, esetleg erős növényekkel.

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

Régebbi neve: Hellabrunni bölcsőszájú hal

syn: *Heros temporalis*, *Cichlasoma temporale*, *Acara crassa*.

Eng: Emerald cichlid, Chocolate cichlid, F cichlid, Hellabrunn cichlid.

Egyéb köznevei: Prapra, Temporalis, Smaragdikirjoahven, Cichlidé émeraude, Rotgrüner Buntbarsch, Smaragdbuntbarsch, Acará açai, Bufurque, Bujurqui, Vieja, Chokladcichlid.

KATEGÓRIÁK:

[Amerikai fajok](#), [Akvárium halak](#), [Bölcsőszájú halak](#)

KULCSSZAVAK:

[Cichlidae](#), [1862](#), [Hypselecara temporalis](#), [Günther](#), [Smaragdsügér](#), [Akvárium halak](#), [akvarisztika](#), [Amerikai sügerek](#)

JELLEMZŐK:

[barna vízi](#), [átlászó vízi](#), [lágyvízi \(5-10 Nk°\)](#), [Dél-amerika](#), [közepesen keményvízi 10-15°Nk](#), [összeférhetetlen viselkedés](#), [Orinoco](#), [közepesen áramló vízi](#), [lassan mozgó vízi](#), [Guyanák](#), [nagy \(több 200 liternél\)](#), [közepesen aktív mozgású](#), [hosszú életű 6 év fölött](#), [félsavas \(6-6.5 pH\)](#), [mindenevő](#), [fekete vízi](#), [hőigényes \(25-30 °C\)](#), [középső szint](#), [gyér növényzetigényű](#), [normál \(6.5-7.5 pH\)](#), [felső szint](#), [óriás méretű 20 cm fölött](#), [savas \(6pH alatt\)](#), [lassú mozgású](#), [Kelet-Dél-Amerika](#), [alsó szint](#), [Amazónia](#), [Amerika](#), [igenlágyvízi \(0-5°Nk\)](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Írta: Honffy Gábor

Katalógusba került: 2009-10-06 09:01:16

Legutolsó frissítés: 2017-02-01 17:08:26

Katalógus ID: 4197

Oldal linkje: https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/bolcsoszaju_halak/amerikai-fajok/hypselecara-temporalis.html

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva