

Iriatherina weneri - Ostoros szivárványhal

ELSŐ LEÍRÓJA:	Meinken, 1974
CSALÁD:	Melanotaeniidae
MÉRET:	3-4 cm
C°:	23-29
pH°:	5,5-7,5
Nk°:	5-20
HELYIGÉNY:	60 liter
VISELKEDÉS:	békés rajhal
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	felső- és középső szint
ÉLETTARTAM:	3-4 év
TERM.VÉD.:	felméretlen



Ezzel a fajjal részletesebben foglalkozunk a következő cikkben:

[2012 Március díszhala: az ostoros szivárványhal](#)

Iriatherina weneri

Ostoros szivárványhal
(Meinken, 1974)

TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Iriatherina weneri – Ostoros szivárványhal elterjedési területe (Distribution map)

TOVÁBBI KÉPEK:



Pápua Új-Guinea nyugati részén (Irian Jaya), illetve déli területein fordul elő, emellett Ausztrália északi – északnyugati régiójában, legfőképp Queenslandben fordul elő. Lassan mozgó és tiszta vizű folyók, lagúnák, mocsarak lakói, ahol sűrű a vízínövényzet.

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

A hal legfeltűnőbb jellegzetessége rendkívül megnyúlt úszói. Az első, lekerekített csúcsú hátúszó magas,

elől ül, a második sugarai fonalszerűen megnyúltak és füstös árnyalatú. A hasúszó szintén füstszínű és fonalszerű; a farok alatti úszónak fekete nyúlványai vannak. A líra alakú farokúszó csúcsai is megnyúltak. A kifejlett példányok aranyló barnázezüst alapszínűek, a hátgerinc mentén kékes fénnel. Hasoldalukon finom, vörösesbarna vonal húzódik. _____

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Kisebb akváriummal rendelkező akvaristák számára ideális választás. Igen nyugodt halak, az egyik legbékésebb faj valamennyi közül. Bármilyen nano hal mellé berakhatjuk őket, nem zavarja még a legkisebb törperazbórákat sem! Mindenféleképpen csapatban tartsuk, ami legalább 6-8 példányt jelent. Csoportos gondozás esetén gyakran fogjuk látni, amint a halak együtt játszanak, kergetőznek, illetve a hímek is rendszeresen felvillantják megnyúlt, fonalas úszóikat és szemkápráztató színeiket.

Nem feltétlenül kezdőknek való hal, s bár nem tartozik a nehezen tartható fajok közé, némi gyakorlat nem árt, ha e faj gondozásába vágjuk fejszénket, rokonaihoz képest valamivel kényesebb. Beállt vizű medencébe kerüljenek, melynek károsanyag-tartalma minimális. Jó biológiai lebontással rendelkező szűrést válasszunk, de ne keltsünk nagy áramlást. Ezek a karcsú, törékeny halak lassú, gyakran álló vizekből származnak, így megerőltető számukra, ha állandó áramlásnak vannak kitéve. Kéthetente cseréljük a tartóvíz egy részét! Oxigénigényesek, érdemes külön porlasztót beszerezni. Kedvelik a melegebb, közepkemény vizet, ami semleges körüli kémhatással bír (enyhén savas vizet még jól viselik).

Általában kristálytishta vizekben fordulnak elő, ahol sűrű a növényzet. Az akváriumban is mindenképp dúsan ültessünk növényeket, melyek kiváló rejtekhelyeket biztosítanak halaink számára. Helyezzünk be gallyakat, ágakat (a csavartfűz erre a célra például remek választás), és alkalmasint használjunk úszónövényeket is. Társításánál csak olyan fajok jöhetnek szóba, amik nem tesznek kárt félénk halainkban. Kerüljük a hirtelen vagy szélsőséges vízminőség-változásokat.

A vadonban apró, gyakran egysejtű planktonikus szervezetekkel táplálkozik, úgy mint algák, zooplankton, apróbb férgek és rákocskák. Ezt akváriumban is megvalósíthatjuk artémia, banán- és kisebb grindálférgek, cyclops, daphnia segítségével. Elfogadja a jó minőségű (és kicsi szemcseméretű) műleségeket is.

Szaporításukkal már jónéhány tenyésztő sikerrel járt, de nem a legegyszerűbb. Hagyhatjuk ugyan a csapatunkat egy dúsan növényesített (és úszónövényekkel ellátott) akváriumban folyamatosan szaporodni, de ez kevésbé produktív módszer, minden ívásból vélhetően néhány ivadék éli csak túl. Bevált módszer,

amikor a legszebb hímet 3-4 jobban kikerekedett nősténnyel különválasztjuk. Helyezzünk az akváriumba finom szálú vízinövényeket vagy mesterséges ikráztató közeget (pl. fonatok, speciális műanyag eszközök), illetve úszónövényeket. Mivel elnyújtott ívású faj, nála is szükség lesz szűrésre. A hőmérsékletet állítsuk magasra, 27-28 °C környékére. Általában nappal ívnak, rendszeresen ellenőrizzük, hogy raktak-e ikrákat, s ha igen, távolítsuk el azokat, mivel a szülők ikrafalók. Ha befejezték az ívást, visszakerülhetnek a tartómedencébe.

Az ivadékok nagyon aprók, így kikelés után papucsállatka, infuzória méretű táplálékkal indíthatjuk őket, míg képesek lesznek nagyobb eleséget is magukhoz venni. Általában a felsőbb régiókban tartózkodnak, számukra is jó lehetőség, ha úszónövényeket helyezünk el. Figyeljünk a szétnövésre, és a vízminőségre is, annak romlása ugyanis gyors és drasztikus mértékű pusztuláshoz vezethet. Ne hagyjunk sok felgyűlt táplálékot, és sűrű, kismértékű frissítő vízcseréssel gondoskodjunk a tartóközeg jó minőségéről. Eleinte lassú a növekedésük, élő eleséggel, tágas hellyel és sűrű vízcserével tudjuk gyorsítani.

Az utóbbi években egészen kedvelté vált az akvaristák körében – köszönhetően elsősorban a nano akváriumok és az akvakertészet térhódításának, ugyanis mindkét ágazat szívesen gondolja e tüneményes fajt. A kereskedésekben kapható példányok döntő többsége tenyésztett, vadonfogott példányok szinte egyáltalán nem kaphatóak.

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

Vitorlás kalászhal

syn:-.

Eng: Threadfin rainbowfish.

Egyéb köznevei: Weneri, Filigran-Regenbogenfisch, Weners Regnbuefisk, Weners stralefisk, Viirikirjokala, Viirisädekala

.

KATEGÓRIÁK:

[Akváriumi halak](#), [Kalászhalak](#)

KULCSSZAVAK:

[Akváriumi halak](#), [Kalászhalak](#), [akvarisztika](#), [Iriatherina weneri](#), [Melanotaeniidae](#), [Ostoros szivárványhal](#), [Meinken](#), 1974

JELLEMZŐK:

[Ausztrália](#), [savas \(6pH alatt\)](#), [felső szint](#), [Észak-Ausztrália](#), [lágyvízi \(5-10 Nk°\)](#), [átlagos élethossza 3-6 év](#), [keményvízi 15-20°Nk](#), [közepes hőigényű 20-25°C](#), [sűrű növényzetigényű](#), [átlátszó vízi](#), [nagy méretű 10-20 cm](#), [közepesen keményvízi 10-15°Nk](#), [állóvízi](#), [Új-Guinea](#), [közepes méretű akvárium 50-100 literig](#), [rövid életű 1-3 év](#), [Queensland](#), [lassan mozgó vízi](#), [békés rajhal](#), [félsavas \(6-6.5 pH\)](#), [közepesen aktív mozgású](#), [hőigényes \(25-30 °C\)](#), [mindenevő](#), [normál \(6.5-7.5 pH\)](#), [középső szint](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

- <http://rainbowfish.angfaqlld.org.au/Weneri.htm>
- <http://www.seriouslyfish.com/species/iriatherina-weneri/>

Írta: Liziczai Márk

Katalógusba került: 2009-09-14 09:01:17

Legutolsó frissítés: 2018-01-30 10:46:29

Katalógus ID: 4280

Oldal linkje: <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/kalaszhalak/iriatherina-weneri.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva