

Julidochromis dickfeldi - Barna torpedósügér

ELSŐ LEÍRÓJA:	Staeck, 1975
CSALÁD:	Cichlidae
MÉRET:	10 cm
C°:	22,0-28,0
pH°:	7,5-8,5
Nk°:	10,0-20
HELYIGÉNY:	90 liter
VISELKEDÉS:	területvédő
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	alsó szint
ÉLETTARTAM:	2-5 év
TERM.VÉD.:	



Julidochromis dickfeldi
Barna torpedósügér
 (Staeck, 1975)

TOVÁBBI KÉPEK:



TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Julidochromis dickfeldi – Barna torpedósügér elterjedési területe (Map)

A Tanganyika-tó sziklás, part menti vizei.

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

A hengeres, világos sárgásbarna testen három, egyenlő távolságra futó, feltűnően sötét, vízszintes sáv húzódik — az alsó a hal középvonalában foglal helyet. A homlokot néhány sötét vonal keresztezi. A nőstények nagyobbak lehetnek.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Kisebb méretű, köves aljzatú medence megfelel e fajnak. A faj érzékeny a jódhányra. A tenyésztés külön akváriumban lehetséges. Sok példányból választódik ki egy pár. Kb. 10 hónapos kort elérve a legnagyobb nőstény párt választ magának. Ekkor a többiit távolítsuk el, mert a szaporodóképes pár agresszívvé válik. Ha élő planktonnal, szúnyoglárvával, esetleg Artemiával tápláljuk őket és emellett 2 hetenként részleges vízcserét is végzünk, kis idő múltával egy barlang mennyezetére felrakják szürkés-fehér ikrájukat. Kb. 15-17 nap múlva a barlangból apró, fekete ivadék jelenik meg. Artemia vagy Cyclops naupliust etetésével gyorsan nőnek. Az akvárium méretétől függően akár több generáció is nevelődhet, mert a pár tovább szaporodik. A nagyobbakat jobb eltávolítani, mert a szülők ilyenkor már vetélytársként kezelik őket.

Egy kisebb akváriumban remekül tenyészthető. Jól társítható egy 1-2 száz literes medencéden, más hasonló fajokkal (Xenotilapia, Altolamprologus, Neolanprologus, csigasügérek, akár lazacsügérek). NE tartsunk együtt kettő vagy több Julidochromis fajt, mert egybeívhatnak és nem,kívánt basztardok keletkezhetnek!!!

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: -.

Eng: Dickfeld s Juli, Dickfeldi, Blue Julie, Brown Julie.

Egyéb köznevei: Stribet slankcichlide, Sinikoruahven, Dickfelds Schlankcichlide, Naskalnik Dickfelda.

KATEGÓRIÁK:

[Afrikai fajok](#), [Akváriumi halak](#), [Bölcsőszájú halak](#)

KULCSSZAVAK:

[Cichlidae](#), [Afrikai sügérek](#), [1975](#), [Barna torpedósügér](#), [Akváriumi halak](#), [Julidochromis dickfeldi](#), [akvarisztika](#), [Staeck](#)

JELLEMZŐK:

[Afrika](#), [lúgos \(8pH-nál több\)](#), [közepesen keményvízi 10-15°Nk](#), [Kelet-Afrika](#), [alsó szint](#), [közepesméretű akvárium 50-100 literig](#), [kissé agresszív viselkedés](#), [közepesen áramló vízi](#), [lassan mozgó vízi](#), [Tanganyika-tó](#), [közepesen aktív mozgású](#), [átlagos élethossza 3-6 év](#), [átlagos növényzetigényű](#), [keményvízi 15-20°Nk](#), [közepes méretű 5-10 cm](#), [állóvízi](#), [féllúgos \(7.5-8 pH\)](#), [közepes hőigényű 20-25°C](#), [gyér növényzetigényű](#), [hőigényes \(25-30 °C\)](#), [átlátszó vízi](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Írta: Honffy Gábor

Katalógusba került: 2008-05-14 09:01:16

Legutolsó frissítés: 2017-03-16 09:27:19

Katalógus ID: 4199

Oldal linkje: https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/bolcsoszaju_halak/afrikai-fajok/julidochromis-dickfeldi.html

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva