

Julidochromis regani - Négycsíkos torpedósügér

ELSŐ LEÍRÓJA:	Poll, 1942
CSALÁD:	Cichlidae
MÉRET:	12 cm
C°:	22,0-25,0
pH°:	7-8,5
Nk°:	8,0-19
HELYIGÉNY:	90 liter
VISELKEDÉS:	kissé területvédő
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	alsó szint
ÉLETTARTAM:	5-8 év
TERM.VÉD.:	nem értékelt




Julidochromis regani
Négycsíkos torpedósügér
 (Poll, 1942)

TOVÁBBI KÉPEK:

TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Julidochromis regani – Négycsíkos torpedósügér elterjedési területe (Map)



A Tanganyika-tó sziklás, part menti vizei.

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

A hal testén hosszirányban négy vagy öt sötét sáv fut végig, melyek a fejre is ráhúzódnak és a farok tövén végződnek. A hal alapszíne aranyárga, de a száj körül és a fej alsó részén világoskék vonalak jelenhetnek meg.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Kissé területvédő hajlamú, tenyésztéshez tartsuk párban egy kisebb méretű akváriumban. Alapos vízszűrést és gyakori részleges vízcserét igényel. A tenyésztés külön akváriumban lehetséges. Sok példányból választódik ki egy pár. Kb. 10 hónapos kort elérve a legnagyobb nőstény párt választ magának. Ekkor a többiit távolítsuk el, mert a szaporodóképes pár agresszívvé válik. Ha élő planktonnal, szűnyoglárvával, esetleg Artemiával tápláljuk őket és emellett 2 hetenként részleges vízcserét is végzünk, kis idő múltával egy barlang mennyezetére felrakják 100 szürkés-fehér ikrájukat. Kb. 15-17 nap múlva a barlangból apró, fekete ivadékok jelennek meg. Artemia vagy Cyclops naupliustal etetésével gyorsan nőnek. Az akvárium méretétől függően akár több generáció is nevelődhet, mert a pár tovább szaporodik. A nagyobbakat jobb eltávolítani, mert a szülők ilyenkor már vetélytársként kezelik őket.

Ha nem csak a párt tartjuk és tenyésztjük egy 100 liter körüli medencében, akkor néhány száz literes akváriumban könnyedén társíthatjuk relatíve kisebb tanganyaikaj fajokkal, jól kijön velük, persze megfelelő hely esetén! NE tartsunk együtt több Julidochromis-fajt, mert egybeívnek és nem kívánt basztard utódok keletkeznek.

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: *Julidochromis regani regani*.

Eng: Four-Stripe Julie, Convict Julie, Striped Julie.

Egyéb köznevei: Regani, Juovakoruahven, Vierstreifen-Schlankcichlide, Naskalnik regana.

KATEGÓRIÁK:

[Afrikai fajok](#), [Akváriumi halak](#), [Bölcsőszájú halak](#)

KULCSSZAVAK:

[Poll, 1942](#), [Cichlidae](#), [Afrikai sügérek](#), [Akváriumi halak](#), [Julidochromis regani](#), [akvarisztika](#), [Négycsíkos torpedósügér](#)

JELLEMZŐK:

[Kelet-Afrika](#), [alsó szint](#), [lassan mozgó vízi](#), [kissé agresszív viselkedés](#), [közepesen aktív mozgású](#), [lágvízi \(5-10 Nk°\)](#), [mindenevő](#), [átlagos növényzetigényű](#), [keményvízi 15-20°Nk](#), [Tanganyika-tó](#), [nagy méretű 10-20 cm](#), [állóvízi](#), [közepes hőigényű 20-25°C](#), [hosszú életű 6 év fölött](#), [féllúgos \(7.5-8 pH\)](#), [átlátszó vízi](#), [gyér növényzetigényű](#), [normál \(6.5-7.5 pH\)](#), [közepesen keményvízi 10-15°Nk](#), [Afrika](#), [lúgos \(8pH-nál több\)](#), [közepes méretű akvárium 50-100 literig](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Írta: Honffy Gábor

Katalógusba került: 2008-05-14 09:01:16

Legutolsó frissítés: 2017-03-16 09:42:20

Katalógus ID: 4201

Oldal linkje: https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/bolcsoszaju_halak/afrikai-fajok/julidochromis-regani.html

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva