

Két új Barbus faj



Barbus seymouri. Kép: Denis Tweddle

Két dél-afrikai tudós -*Denis Tweddle* és *Paul Skelton* - leírt két új pontyfajt Malawiból. A két újonnan felfedezett, nagytestű márnát *Barbus seymouri*-nak és *Labeobarbus nthuwa*-nak nevezték el, és leírásukat közreadták a *Smithiana Bulletin* legújabb számában. Mindkét új fajt a Dél-Rukuru folyóban találták, mely a Malawi tóba folyik.

Ez a hal közepes méretű (akár 108 mm SL), robusztus felépítésű, *Barbus* fajokra jellemzően megcsontosodott, fűrészszélű, hátranéző egyszerű sugarú pikkelyekkel és 26-29 oldalvonalai pikkellyel rendelkezik, uszonyai színezete rózsaszínes-narancssárga, és található az oldalán egy olyan középpoldali fekete csík, ami keresztülhúzódik a faroknyélen és a testen, egészen a farokúszóig, de nem húzódik át az orrészre.

Ez a hal különbözik a többi a régióban fellelhető narancssárga uszonyú "*Barbus*" fajtól abban, hogy a fűrészfogazott tüske nem emelkedik ki hátúszójából, míg többi faj hátúszójánál ez nagyításnál észrevehető, és a középpoldali csík pigmentáltságában is. A szerzők szerint, a folyó, ahol az új fajokat fogták általában tiszta, erősen áramló, növényzetben gazdag és/vagy sziklás. Ezt a fajt a néhai *Tony Seymour* után nevezték el, elismerve Malawinak tett sok éves szolgálatát, nem csak amit a haltudományban elért, hanem a környezetgazdálkodás és megőrzés hosszú távú

kutatásában, és elkötelezettségéért Malawi tó halászhai iránt. A nem-nevet ideiglenesen használják, mert úgy vélik, hogy a kisebb, afrikai márnák, melyek hagyományosan képviselik a nemet, nem ugyanoda tartoznak, ahová a valódi Márná-félék, azaz ahová a legtöbb európai faj. Mindazonáltal tanulmányokat nem adtak ki, amíg nem tisztázzák a faji besorolás kérdéseit. Ez a faj párhuzamosan barázdált, keményen csontosodott, fogazatlan pikkelyekkel, hátranéző elágazás nélküli hátúszósugárral, összesen öt elágazás nélküli hátoldali csíkkal, és 30-33 oldaloldallvonalai pikkellyel rendelkezik.



Labeobarbus nthuwa. Kép: Denis Tweddle

Így különbözik a két Malawi-tavi *Labeobarbus*-tól (*L. johnstonii* és *L. brevicauda*) pikkelyei számában, és a háti-tüske csontosodásának külalakjában, a Zambézi folyó és a keleti-part folyójában, a Phongolo-ban honos *L. marequensis*-től a kopoltyú-ívek számában, a faroknyél arányában, és a csontos háti-tüskében, valamint különbözik hátúszójának magassági jellemzőjével az *L. codringtonii*-től is, amely a Felső-Zambézi-ben él. A szerzők közölték, hogy az összes mintavételi-helyszínen, ahol a fajt begyűjtötték, sziklás volt, gyorsfolyású, néhány mélyebb medencével tarkítva. A fajt a hal helyi neve után nevezték el. Ráadásul e két új pontyfélé leíró tanulmányában a szerzők említenek még több leíratlan fajt a déli Rukuru folyóból, melyben még

élhet legalább egy másik *Barbus*-faj, és az *amphiliid*-nemből két *Zaireichthys* harcsa-faj.

Heok Hee Ng 2008. március 26.

Fordította: gabrinus

KATEGÓRIÁK:

[Díszhal](#), [Hírek](#)

KULCSSZAVAK:

[díszhal](#), [Hírek](#)

Beküldte: gabrinus

Katalógusba került: 2008-05-01 10:47:00

Legutolsó frissítés: 2008-05-01 10:47:00

Katalógus ID: 6918

Oldal linkje:

<https://akvaristalexikon.hu/hirek/ket-uj-barbus-faj.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva