

Labeo chrysophekadion - Fekete rojtosszájú hal

ELSŐ LEÍRÓJA:	Bleeker, 1850
CSALÁD:	Cyprinidae
MÉRET:	50 cm
C°:	24-27
pH°:	6,5-7,5
Nk°:	5-15
HELYIGÉNY:	650 liter
VISELKEDÉS:	enyhén agresszív
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	talajlakó
ÉLETTARTAM:	5-15 év
TERM.VÉD.:	gyakori



Labeo chrysophekadion

Fekete rojtosszájú hal

(Bleeker, 1850)

TOVÁBBI KÉPEK:



TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Labeo chrysophekadion – Fekete rojtosszájú hal elterjedési területe (Map)

Jáva, Borneó, Szumátra, Thaiföld és Kambodzsa édesvizei.

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

Az ivarérett fekete rojtosszájúhal szürkésfekete színű: az idős példányok sötét, bársonyos feketék. A fiatalok pikkelyeinek közepe vörös vagy arany színű, ezért csillogó külleműek. Nagy, háromszögletű hátúszója a cápákéra emlékeztet.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Békés hal, kedveli az algákat és a zöld eleséget, de mindennemű táplálékot elfogad. Habár valamelyest

fogyasztja az algát, csodát ne várjunk tőle. Zöld eleség gyanánt forrázott saláta, spenót, uborka, cukkini lehet eledele. Ezt ki lehet egészíteni fagyasztott és élő tápokkal, mint a tubifex, szúnyoglárva, de nagyobb eledeleket is kaphat, mint amilyen a fagyasztott hal, garnéla, stb. Száraz tápokból a harcsatabletták megfelelőek etetésére.

Szürkületben mozog!

A búvóhelyek mennyiségére azért figyeljünk, de általában csak egy példányt szoktak gondozni. Sügérek, nagy testű halak (arowanák, cápharcsák, stb.) kiváló társhala. Csak nagy méretű akváriumban szabad elhelyezni, ahol erős szűrés biztosított. Kis helyen agresszívvé válhat, illetve ha több halat zsúfolunk össze. Rokonságban áll a stendhal-hallal, de azért nem olyan vad természetű. Kövekkel, ágakkal dekorálhatunk, apró szemű aljzatot tegyünk a medencébe. A gyöngébb növényeket kitúrhatja.

Akváriumban nem tenyésztik, erre sajnos nincs lehetőség, valószínűleg mérete miatt sem érheti el akváriumban az ivarérettséget. A tartott példányok vagy vadbefogásból vagy hormonkezeléses ívatásból származnak.

Albínó variánsa is létezik.

Ismeretes egy hasonló faj, amit ördögmárna (*Labeo barbatus*) néven szoktak forgalomba hozni, de az nem ilyen fekete, csak szürkés színezetű.

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: *Morulius chrysophekadion*, *Rohita chrysophekadion*, *Rohita cyanomelas*.

Eng: Black sharkminnow, Black sharkminnow, Black shark.

Egyéb köznevei: Labeo černé, Parmička černá, Parmička žraločí, Sort hajbarbe, Sort Labeo, Mustahuulibarbi, Mustalabeo, Schwarzer Fransenlipper, Kak', Kaek, Trey kaek, Pa phia, Cá Ét mòi.

KATEGÓRIÁK:

[Pontyfélék](#), [Akváriumi halak](#)

KULCSSZAVAK:

[Akváriumi halak](#), [1850](#), [akvarisztika](#), [Fekete rojtosszájú hal](#), [Labeo chrysophekadion](#), [Cyprinidae](#), [Pontyfélék](#), [Bleeker](#)

JELLEMZŐK:

[Ázsia](#), [óriás méretű 20 cm fölött](#), [Dél-Ázsia](#), [Indonézia](#), [közepesen keményvízi 10-15°Nk](#), [Szumátra](#), [közepesen áramló vízi](#), [Thaiföld](#), [nagy \(több 200 liternél\)](#), [lassan mozgó vízi](#), [Borneó](#), [hőigényes \(25-30 °C\)](#), [közepesen aktív mozgású](#), [normál \(6.5-7.5 pH\)](#), [mindenevő](#), [hosszú életű 6 év fölött](#), [alsó szint](#),

átlagos növényzetigényű, kissé agresszív viselkedés, lassú mozgású, lágylvízi (5-10 Nk°), barna vízi, gyér növényzetigényű.

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Írta: Honffy Gábor

Katalógusba került: 2009-06-05 09:01:15

Legutolsó frissítés: 2014-06-18 15:02:35

Katalógus ID: 3962

Oldal linkje: <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/pontyfelek/labeo-chrysophekadion.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva