Labeotropheus fuelleborni - Fuelleborn-Ormányossügér

ELSŐ LEÍRÓJA:	Ahl, 1926
CSALÁD:	Cichlidae
MÉRET:	16 cm
C°:	22,0-25,0
pH°:	7,5-8,5
Nk°:	10-12
HELYIGÉNY:	380 liter
VISELKEDÉS:	harcias
TÁPLÁLÉK:	növényevő
TARTÓZKODIK?	középső- és alsó szint
ÉLETTARTAM:	8-12 év
TERM.VÉD.:	nem értékelt



Labeotropheus fuelleborni
Fuelleborn-Ormányossügér
(Ahl, 1926)

TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Térkép még nem készült az adatlaphoz, feltöltése folyamatban!

TOVÁBBI KÉPEK:



A Malawi-tó sziklás, part menti vizei.

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

A fajnak sok színváltozata van, főként a nőstények között, melyek narancssárga és fekete foltokat viselhetnek. Testük hengeres, egyaránt megnyúlt és oldalról összenyomott, a hímek mindig nagyobbak, mint a nőstények és színezetük minden esetben eltérő, de a hím kékesszürke testén sötét függőleges sávok vannak. A nőstény ezzel szemben világos aranybama, elszórt pettyekkel. A hímek farok alatti úszóján ikrafoltok vannak. A nem jellegzetessége a lefelé hajló felső ajak, ezzel szedik le az algákat a kövek felszínéről.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

A népszerű ormányos sügerek nemébe mindössze két faj tartozik, a *Labeotropheus trewavasae* és a *Labeotropheus fuelleborni*. Táplálékuk nagy részét az algák képezik, melyeket egy különleges technikával legelnek le a kövekről. A porcos orrot a kő oldalának nyomják, és így testük egy olyan szöget vesz fel, hogy a normális úszóálláson nem kell változtatniuk, viszont a leghatékonyabban tudják az algát a kőről letépni. Mivel az egész tó területén megtalálhatók, számtalan színváltozatuk létezik. Akváriumban történő társításuk nem jelent gondot, mivel alapvetően jó természetűek, bár a hímek közül mindig van domináns, és a szaporodás az ő kiváltsága. A más fajokkal történő társításnál elsődleges szempont a táplálkozás hasonlósága legyen. Ezért etetésük folyamán törekednünk kell arra, hogy javarészt könnyen emészthető növényi alapanyagokat, vagy s spirulina alga tartalmú táplálékot kapjanak. Ha ezeket a minőségi eledeleket etetjük folyamatosan, akkor elkerülhetjük a jellegzetes betegségüket, a gyomor- és bélgyulladást. Egyes populációk esetében a nőstények színezete ivadékkortól eltér a hímekétől. Legtöbb esetben OB foltos vagy sárga színű.

Viszonylag jól rászoktathatók a vegyes táplálkozásra, mert kevésbé gyomorérzékenyek, mint a L. trewavasae, de azért ügyelnünk kell, hogy az állati eredetű táplálékból a könnyebben emészthetőket etessük velük, pl. tonhal és rákok. A marhaszív etetését mellőzzük! A nőstények nehezebben ikrásodnak be, mint a másik faj nőstényei, de ha leikráznak, akár 70 db viszonylag nagy méretű ivadék is lehet egy szájköltésből. Szaporodásukkal különösebb probléma elé nem állítják a tenyésztőt. Mivel alkalmi párválasztók, egy jól táplált nőstény 30-70 db ivadék költésére folyamatosan képes. 14-18 nap között az ivadékok elvehetők a nősténytől.

Bővebben: [Lukács - Sinkó: A Tanganyika-tó és a Malawi-tó sügérvilága, Balatonpress, 2009)]

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: *Labeotropheus curvirostris*.

Eng: Blue mbuna, Fuelleborn s cichlid, Malawi blue cichlid.

Egyéb köznevei: Sininenäahven, Schabemundbuntbarsch, Utaka, Pyszczak blekitny, Kili, Bla Näbbcichlid, Chikoku.

KATEGÓRIÁK:

Afrikai fajok, Akváriumi halak, Bölcsőszájú halak

KULCSSZAVAK:

Afrikai bölcsőszájúhalak, 1926, Fuelleborn-Ormányossügér, Akváriumi halak, Labeotropheus fuelleborni , akvarisztika, Ahl, Cichlidae

JELLEMZŐK:

középső szint, átlagos növényzetigényű, Malawi-tó, nagyméretű 10-20 cm, állóvízi, növényevő, hosszú

életű 6 év fölött, nagy (több 200 liternél), közepes hőigényű 20-25°C, gyér növényzetigényű, féllúgos (7.5-8 pH), átlátszó vízi, Afrika, lúgos (8pH-nál több), közepesen keményvízi 10-15°Nk, alsó szint, lassan mozgó vízi, Kelet-Afrika, összeférhetetlen viselkedés, közepesen aktív mozgású.

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Írta: Honffy Gábor
Katalógusba került: 2008-05-14 09:01:16
Legutolsó frissítés: 2013-11-17 13:33:26
Katalógus ID: 4203
Oldal linkje: https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/bolcsoszaju_halak/afrikai-fajok/labeotropheus-fuelleborni.html

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva