

Lamprologus multifasciatus - Sokcsíkú csigasügér

ELSŐ LEÍRÓJA:	Boulenger, 1906
CSALÁD:	Cichlidae
MÉRET:	4 cm
C°:	25-27
pH°:	7-8
Nk°:	10-20
HELYIGÉNY:	45 liter
VISELKEDÉS:	csapatos
TÁPLÁLÉK:	ragadozó
TARTÓZKODIK?	alsó-középső
ÉLETTARTAM:	6-8 év
TERM.VÉD.:	



Lamprologus multifasciatus

Sokcsíkú csigasügér

(Boulenger, 1906)

TOVÁBBI KÉPEK:

TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Lamprologus multifasciatus – Sokcsíkú csigasügér elterjedési területe (Map)



Kelet-Afrika; Tanganyika-tó

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

Apró termetű sügér faj, esztöten csillogó alapszínezettel. Ezt sok, vékony halványbarna függöleges kis csík díszíti, az úszókon pedig apró kékes minták fedezhetöek fele.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

A faj az egyik legapröbb termetű sügér faj a világon, nagy családi közösségekben él. 40-50 liter közötti medencébe 10-15 példány is gondozzható, elsőre ha egy 6-7 példányt telepítünk, úgy is megfelelő, késöbb

úgyis elszaporodnak. A berendezés különösen fontos számára. A legfontosabbak a nagy csigaházak, például az alaposan fertőtlenített üres éti csiga házai. Egy 10-15 fős kolóniának akár 25-30 csigaházat is tehetünk be. A kioldódó mész nem káros rájuk, mivel amúgy is kemény vízben élnek. Fontos, hogy apró szemű sódertalaj legyen a medencében, mivel szeretnek rendezkedni. Ágak, kövek, növényzet gyakorlatilag felesleges akváriumukba. Vizüket célszerű erősen szűrni, hogy tiszta és bomlástermékmentes legyen. Egyfajos módon tartva egy idő után megbátorodnak, bár a zsúfoltságot remekül bírják. A külső zavarásokra érzékenyek, erre meneküléssel reagálnak, és csigaházaikba bújnak. Nagyobb medencékben más tanganyikás fajokkal is társítható (*Neolamprologus brichardi*, *Julidochromis regani*, stb.), ilyenkor felbátorodnak, és "kiskakasként" védelmezik gyakran területüket, nem fogják menekülőre oly gyakran. Lehetőleg gyakran cseréljük vizét, és oxigéndús is legyen. Kezdők számára megfelelő halak. Etetésük nem problémás, száraz granulátumokat, élő és fagyasztott tápok (artemia, daphnia, cyclops, walterféreg, fehér szúnyoglárva, stb.) fogyaszt, a természetben zooplanktonevő.

A nemek nehezen megkülönböztethetőek. Párválasztó, de a hímek háremet is tarthatnak. Ikrákat csigaházakba helyezik, amire a szülők vigyáznak. A peték akár már 1 nap leteltével kikelhetnek, majd még egy hétig élnek szikzacskójukból és elúsznak. Artemiával indíthatóak. Kezdetben gyakran bemenekülnek még a csigaházakba. A szülők próbálnak vigyázni rájuk, de esetleg a kolónia tagjai egy-két kishalat elragadhatnak, ezért ha eladásra tenyésztünk, a legbiztosabb eredményt különválasztással érhetjük el, de általában elég sok kishal megmarad a közös medencében is.

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: *Neolamprologus multifasciatus*.

Eng: Multi, Many Banded Shell-Dweller, Multifasciatus Dwarf Cichlid.

Egyéb köznevei: Seeprakotiloahven, Schneckenbuntbarsch, Gele Sulawesi Slak, Muszlowiec Wielopęgi, Лампрологус многополосый, Mångbandad snäcklekare.

KATEGÓRIÁK:

[Afrikai fajok](#), [Bölcsőszájú halak](#), [Akváriumi halak](#)

KULCSSZAVAK:

[Akváriumi halak](#), [akvarisztika](#), [Boulenger](#), [1906](#), [Cichlidae](#), [Afrikai sügérek](#), [Lamprologus multifasciatus](#), [Sokcsíkú csigasügér](#)

JELLEMZŐK:

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Írta: Liziczai Márk

Katalógusba került: 2012-08-28 09:01:17

Legutolsó frissítés: 2017-02-01 14:25:43

Katalógus ID: 4429

Oldal linkje: https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/bolcsoszaju_halak/afrikai-fajok/lamprologus-multifasciatus.html

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva