

Luciosoma spilopleura - Foltos csukamárna

ELSŐ LEÍRÓJA:	Valenciennes, 1842
CSALÁD:	Cyprinidae
MÉRET:	25 cm
C°:	24-26
pH°:	6-7,5
Nk°:	5-12
HELYIGÉNY:	500 liter
VISELKEDÉS:	kissé agresszív
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	felső-középső
ÉLETTARTAM:	5-8 év
TERM.VÉD.:	felméretlen



Luciosoma spilopleura
Foltos csukamárna
(Valenciennes, 1842)

TOVÁBBI KÉPEK:

TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Luciosoma spilopleura – Foltos csukamárna elterjedési területe (Map)



Borneó, Jáva, Szumátra és Thaiföld patakjai, folyói.

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

Enek a halnak az ezüstös oldala is halványzöld árnyalatú az oldalvonal fölött és pikkelyei szintén nagyok. Fekete vonal húzódik a fejtől a faroknyeléig, ahol a nagy, erősen villás farokúszó felső lebenyében folytatódik. A farokúszó alsó lebenyén szintén van egy fekete csík. A has-úszó sugarai megnyúltak, és a mellúszó hátrafelé eléri a has-úszót.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Nagy, fedett akvárium felel meg számára. Mivel erős hal, olyan tetőt válasszunk, amit nem képes

egyszerűen eltörni, mert bizony egy vékony üveglap nem akadály egy kifejeletten ugráló halnak. Ugrálós.

Többedmagával is tarthatjuk, de ha csak egy-két halat tartunk, agresszió is kialakulhat közöttük. Hiába hasonló, fontos megjegyezni, hogy nem csuka, tehát viselkedésében se a csukaféléknél szokottakat várjuk, bár szó ami szó, hasonlít hozzá. A kifejlett halak dominálási harcai ellehetetleníthetik a többi társhal táplálékhoz jutását.

Társaságnak hasonló méretű pontyféléket válasszunk (cáпамárna, sziámi vörösúszójú márna, daruphan márna, hampala, stb.) első körben, valamint a kisebb, viszont gyors mozgásúakat, mint amilyenek a malabári dániók is. A lassú és/vagy kisebb halakat bánthatja (pl. törpe gurámi, vitorlášhal). Talajlakó harcsákat, díszcsíkokat rakhatunk mellé. A hozzá nagyon hasonló lakókkal is agresszív lehet.

Megfelelő méretű kiúszóterre is szüksége van, erősebb áramlást is biztosíthatunk neki. Egy nagy akváriumnál, és persze nagy halaknál mindenképpen erős külső filtrálás elengedhetetlen, a maga megfelelő biológiai lebontóközegével. Porlasztást is alkalmazhatunk.

Ragadozó beütésű, ezért az erősebb növények biztonságban vannak, de a zsenge levelűekből bizony csipkedhet, ezt vegyük figyelembe a medence növényesítésénél, ami ne legyen túl dús... A tereptárgyak se lógjanak be úszóterébe.

Etetésére szárazeledeleket is használhatunk, de fagyasztott és élő tápokat is kaphatnak, mint a tubifex, szúnyoglárva, garnélák, kishalak. Némi - kevés - növényi táplálékkal is kiegészíthetjük étrendjét.

Akváriumi tenyésztése megoldatlan.

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

Apolló-márna

syn.: -

Eng.: Apollo sharkminnow, Apollo shark

Egyéb köznevei: *Chang wa ronaung, Geddehaj, Parmička apolónská, Vader tečkovaný, Haukibarbi, Seitenfleck-Hechtbarbe, [?][?][?][?][?]*

KATEGÓRIÁK:

[Pontyfélék](#), [Akváriumi halak](#)

KULCSSZAVAK:

[Valenciennes](#), [Cyprinidae](#), [Akváriumi halak](#), [1842](#), [akvarisztika](#), [Pontyfélék](#), [Foltos csukamárna](#), [Luciosoma spilopleura](#)

JELLEMZŐK:

mindenevő, nagy (több 200 liternél), középső szint, sárga vízi, félsavas (6-6.5 pH), felső szint, gyors vízáramlású, hőigényes (25-30 °C), átlagos élethossza 3-6 év, Borneó, normál (6.5-7.5 pH), átlagos növényzetigényű, kissé agresszív viselkedés, hosszú életű 6 év fölött, lágynyízi (5-10 Nk°), barna vízi, közepes hőigényű 20-25°C, Ázsia, gyér növényzetigényű, közepesen keményvízi 10-15°Nk, Dél-Ázsia, óriás méretű 20 cm fölött, közepesen áramló vízi, Szumátra, közepesen aktív mozgású, Thaiföld.

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Írta: Honffy Gábor

Katalógusba került: 2009-06-05 09:01:15

Legutolsó frissítés: 2014-06-29 10:53:59

Katalógus ID: 3961

Oldal linkje: <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/pontyfelek/luciosoma-spilopleura.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva