

Macropodus opercularis - Kínai paradicsomhal

ELSŐ LEÍRÓJA:	Linnaeus, 1758
CSALÁD:	Osphronemidae
MÉRET:	8-10 cm
C°:	15-27
pH°:	6-8
Nk°:	5-25
HELYIGÉNY:	80 liter
VISELKEDÉS:	kissé agresszív
TÁPLÁLÉK:	ragadozó
TARTÓZKODIK?	összes szint
ÉLETTARTAM:	4-6 év
TERM.VÉD.:	nem fenyegetett



Macropodus opercularis

Kínai paradicsomhal

(Linnaeus, 1758)

TOVÁBBI KÉPEK:



TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Macropodus opercularis – Kínai paradicsomhal elterjedési területe (Map)

Kelet - Délkelet-Ázsiai elterjedésű faj, élőhelyének döntő többsége Kínában található, de Oroszországból is kimutatták. Délen Tajvan, Laosz, Vietnam és Malajzia területén éri el elterjedésének határvonalát. Elsősorban sekély, álló vagy esetleg lassan áramló vizekben, rizsföldek mocsaraiban található meg.

Japánba, Koreába, Madagaszkárra és a Fülöp-szigetekre betelepítették.

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

Hosszúkás, elég erőteljesnek hat, oldalt elöl kevésbé, hátul jobban lapított. A páratlan úszók és a hasúszók - elsősorban a hímeknél - hosszú fonalakban végződnek, a farokúszó első és utolsó néhány sugara szintén hosszan megnyúlt. Rendkívül dekoratív, fényes kékeszöld alapon több vörös keresztsáv látható rajtuk, a hím torka és hasa ívásidőben bársonyfekete. A kopoltyúfedőkön, amelyek izgalmi állapotban elállnak, vörös szegélyű kékeszöld folt van. Az úszók kékesek vagy vörösek, és sok kék vonás és szegélyrész díszíti őket. A hím színezete élénkebb, ajka kifejezetten duzzadt. A nőtény inkább szürkésbarna tónusú, de rajta is ugyancsak megfigyelhetők a kék és piros keresztsávok.

Több színváltozatát is kitenyésztették már, létezik albínó, vörös, xanthorisztikus és kék variánsa is, melyek mind nagyon mutatósak. Az albínó különösen kedvelt nálunk is!

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

A kínai paradicsomhal igen régóta ismert, közkedvelt díszhal. Gyakorlatilag megállapíthatjuk róla, hogy az első trópusi hal, amit Európában sikeresen tartottak akváriumban. A paradicsomhalat 1869-ben az első egzóták egyikeként egy francia hozta be Európába, s a neves Carbonnier haltenyésztőnek rövidesen sikerült szaporodásra bírnia. Ezzel nem csak az első sikeresen gondozott, hanem egyúttal az első akváriumban sikeresen szaporított trópusi díszhallá vált. Ettől a törzstől származik az akváriumainkban található paradicsomhalak többsége.

Pompás színei méltán alátámasztják, miért nem csökkent népszerűsége immáron több, mint 150 éves pályafutása alatt sem. Hihetetlenül szívós és könnyedén gondozható faj, kezdők egyik legideálisabb választása, s mindemellett legszebb halaink közt tartjuk számon (kiváltképp a nászruhas hímeket). A paradicsomhalak számára egy átlagosan szűrt medence teljesen megfelel, s még az oxigénszegény közeget is jól viselik, labirintszervüknek hála. Nagyfokú alkalmazkodóképességük tette lehetővé, hogy Ázsiában is széles körben elterjedjenek. Szívóssága természetesen nem ok arra, hogy elhanyagoljuk halainkat, így a részleges vízcseréről náluk se feledkezzünk meg. A legtöbb hazai csapvíz alkalmas tartására (ezek általában semleges kémhatású, közepkemény vizek), de ettől némiképp eltérő értékeken is tarthatóak. A legideálisabb számukra egy enyhén savas – semleges, kicsit lágyabb tartóvíz.

A hőmérséklet tekintetében egyáltalán nem kényesek, fűtetlen szobai akváriumban is kiválóan tarthatóak. Bár nagyon jól viselik a magasabb (27-30 °C) hőmérsékletet is (azonban ez élettartamukat rövidítheti), ha a természetes körülményeknek megfelelően kívánjuk gondozni paradicsomhalainkat, inkább a hűvösebb vizet részesítsük előnyben. Ettől függetlenül megállapítható, hogy ugyan élőhelytől függően, de 10 és 30 °C közötti hőmérséklet-tartományban is találtak már belőlük a természetben. Nyáron kitűnően gondozhatóak szabadtéren, kertben elhelyezett medencékben, tavakban. A természetes táplálék és napfény hatására impozáns színeket ölt. Akváriumukat bátran növényesítsük, szívesen úszkálnak ugyanis hínárok és más vízinövények levelei között. Egyébiránt kedvünkre dekorálhatjuk akváriumukat, de érdemes megjegyezni, hogy a sötét aljzat és az úszónövények kiemelik színeiket és fokozzák

biztonságérzetüket. Aktív halak, általában sokat tartózkodnak az akvárium előterében, ahol jól megfigyelhetjük őket. Etetésük is teljesen problémamentes, szinte bármilyen tápot szívesen fogyasztanak, mohón táplálkoznak. Felső állású szájuk felszíni táplálkozáshoz alkalmazkodott, adhatunk nekik lemezes és granulált tápok, fagyasztott és élő eledeleket egyaránt, szinte minden gyakran használt díszhaleleséget elfogyasztanak.

Tán egyetlen hátulütője a fajnak a viszonylag támadékony magatartása, bár ez relatív, és sokszor egyedfüggő. Ha kellő hely áll rendelkezésükre, akkor nem kell sok problémával számolnunk. Arra ügyeljünk, hogy túl apró halak ne kerüljenek melléjük, melyekben esetleg kárt tehet, illetve sok hím egyedet ne zsúfoljunk össze. Kisebb akváriumban érdemes egy hímét tartani, vagy egy hímét és 2-3 nőtényt. 100-150 litertől már több hím is problémamentesen megfér egymással, túltúll szűk helyen viszont a nőtények is idegesebbek lehetnek. Lehetőleg 75-80 liternél kisebb akváriumba ne kerüljenek. Társhalai lehetnek hasonló méretű fajok: dániók, nagyobb razbórák, díszmárnák, gurámik, díszcsíkok és harcsák mind remek választást jelentenek, de társas medencében gond nélkül együtt tarthatjuk őket közepes-nagyobb és nem fátylas elevevűszülőkkel (pl.: xifó) és lazacokkal (pl.: rózsaszínű, fekete tetra), békésebb sügérfélékkel (pl.: vitorlášal, meggyhasú sügér) egyaránt.

Az ivarok megkülönböztetése rendkívül egyszerű, a hímek ugyanis jóval nagyobbak, színesebbek és úszóik is megnyúltabbak a nőtényekhez képest. Szaporításuk meglehetősen könnyű, kezdőknek is ajánlott! A tenyésztő akváriumba a legszebb hímét az ikráktól legkerekebb nőtény társaságában kell kihelyezni, 25-27 °C-os hőmérsékletű vízbe. A szaporító medencébe helyezzünk sok vízinövényt, főleg úszónövényeket. A hím a habfészket a víz felszínére, jellemzően úszónövények közé építi. A pázás a fészkek alatt történik meg, a hím átöleli a nőtényt, és egyből megtermékenyíti az ikrákat. Ezután mindkét szülő elkezd a fészkekbe hordani a termékeny ikrákat, melyeknek száma akár 500 is lehet. Munkájuk befejeztével a hím azonban elzavarja a nőtényt, így azt célszerű ekkor eltávolítani, ugyanis a hímek agressziója akár a nőtény pusztulásáig is fajulhat (társas medencében is leginkább íváskor agresszívek más halak irányába). A hím gondoskodik a fészkekről, s ha jól tápláljuk, a kikelő kishalakat nem bántja, de érdemes legkésőbb az ikrázás után pár nappal őt is eltávolítani. Az ívástól számított 4 nap elteltével kezdenek meg a porontyok táplálkozni, indítóeleségnek infuzória, papucsállatka, tojássárgája ajánlható, de hamar áttérhetünk a frissen keltett artémiára. A kishalak tágas hely esetén gyorsan fejlődnek és viszonylag hamar színesednek. A szétnövésre ügyeljünk!

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: *Chaetodon chinensis*, *Labrus opercularis*, *Labrus operculatus*, *Macropodus chinensis*, *Macropodus ctenopoides*, *Macropodus filamentosus*, *Macropodus venustus*, *Macropodus baviensis*, *Macropodus paradisi*, *Macropodus viridiauratus*, *Platypodus fruca*, *Polyacanthus opercularis*, *Polyacanthus viridiauratus*.

Eng: Paradise fish, Forktail fightingfish, Roundtail paradisefish.

Egyéb köznevei: Fa sau gun, Almindelig Makropode, Paradisfisk, Kiinanparatiisikala, Großflosser,

Paradiesfisch, Gabelschwanzmakropode, Taiwan-kingyo, Wielkopletw wspanialy, Makropod.

KATEGÓRIÁK:

[Akváriumi halak](#), [Labirintkopoltyús halak](#)

KULCSSZAVAK:

[Akváriumi halak](#), [akvarisztika](#), [1758](#), [Linnaeus](#), [Labirintkopoltyús halak](#), [Kínai paradicsomhal](#), [Macropodus opercularis](#), [Osphronemidae](#)

JELLEMZŐK:

[Kelet-Ázsia](#), [féllúgos \(7.5-8 pH\)](#), [sűrű növényzetigényű](#), [közepesméretű akvárium \(50-100 literig\)](#), [Kína](#), [félsavas \(6-6.5 pH\)](#), [ragadozó](#), [Vietnám](#), [hőigényes \(25-30 °C\)](#), [állóvízi](#), [közepes méretű 5-10 cm](#), [alsó szint](#), [barna vízi](#), [átlátszó vízi](#), [nagyon keményvízi \(20-30°Nk\)](#), [Ázsia](#), [közepesen áramló vízi](#), [kissé agresszív viselkedés](#), [Dél-Ázsia](#), [lassan mozgó vízi](#), [lágyvízi \(5-10 Nk°\)](#), [Thaiföld](#), [közepesen aktív mozgású](#), [hidegvízű élőhelyek \(5-20°C\)](#), [sárga vízi](#), [felső szint](#), [közepes hőigényű \(20-25°C\)](#), [Dél-Kína](#), [Japán](#), [átlagos élethossza 3-6 év](#), [közepesen keményvízi \(10-15°Nk\)](#), [Indokína](#), [Észak-Ázsia](#), [átlagos növényzetigényű](#), [keményvízi \(15-20 Nk°\)](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

- Horst Linke: **Labyrinthfische**

Írta: Liziczai Márk

Katalógusba került: 2009-12-14 09:01:16

Legutolsó frissítés: 2018-08-28 14:10:00

Katalógus ID: 4252

Oldal linkje: <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/labirintkopoltyus-halak/macropodus-opercularis.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva