

Maylandia estherae - Vörös zebrasügér

ELSŐ LEÍRÓJA:	Konings, 1995
CSALÁD:	Cichlidae
MÉRET:	10 cm
C°:	25-27
pH°:	7-8
Nk°:	10-20
HELYIGÉNY:	200 liter
VISELKEDÉS:	aránylag jól társítható
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	leginkább közepső
ÉLETTARTAM:	10 év
TERM.VÉD.:	


Maylandia estherae
Vörös zebrasügér

(Konings, 1995)

TOVÁBBI KÉPEK:
TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:


Maylandia estherae – Vörös zebrasügér elterjedési területe (Map)



Kelet-Afrika; Malawi tó

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

Tipikus sügéralkatú ragadozók. A színeik eléggé változékonyak, sok variánsuk van forgalomban. A hímek és nőstények közt általában színbeli különbség is van, egyes variánsoknál a hímek kékek, a nőstények rózsás-pirosas színűek.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Köznapi elnevezése Rot-Rot sügér. Hasonló kaliberű, pl.: Mbuna sügérekkel jól társítható, kevésbé

agresszív faj. Ettől függetlenül, kellő úszóhelyet hagyva, helyezzünk be köveket, mivel így külön területeket tudnak a sügérek kijelölni, és persze búvóhelynek sem utolsók. Erős növényekkel dekorálhatunk, amiket nem tudnak megcsipkedni, kiásni (pl.: Anubias).

Tartásuk kezdőknek sem problémás, számukra ajánlható, nem igényes sügérféle. A külső szűrő akváriummérete végett is alapkövetelmény, de az átlagnál nem igényesebb a víz ilyen tekintetbeni minőségére. A kereskedelemben tömördek változata szerezhető be.

Etetése sem problémás, száraz tápokat is fogyaszt, de ezeket sügérmixekkel, fagyasztott és élő eleségekkel (fehér szúnyoglárva, plankton, artemia), valamint forrázott zöldségekkel etessük. Mint a legtöbb Mbuna, ez a faj is igényel zöldeléséget, zöldségeken kívül például spirulinát. A természetben algákat is fogyaszt.

Tenyésztése nem nehéz, lapos tereptárgyakra ívnek, a hím a nőstény szájában termékenyít, az ikrafoltok módszerével. A kevés (20-30) petét a nőstény 2-3 hétig forgatja, ezidő alatt nem is táplálkozik. Szervezete legyengülés és ezáltal a többi hal támadása kivédésére elkülöníthetjük, bár ha nem agresszív fajokkal társítjuk, nem lesz vészes az időszak. A kishalakat persze nem árt elkülöníteni, indításuk sórákkal és spirulinával megoldható. Rendszeres vízcsere és helybőség mellett gyorsan nőnek.

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: *Metriaclima estherae*, *Pseudotropheus estherae*.

Eng: Red Zebra Mbuna, Ice Blue Zebra, Cherry Red Cichlid, Orange Blotch Cichlid.

Egyéb köznevei: Cichlid modrožlutý.

KATEGÓRIÁK:

[Afrikai fajok](#), [Akváriumi halak](#), [Bölcsőszájú halak](#)

KULCSSZAVAK:

[Akváriumi halak](#), [akvarisztika](#), [1995](#), [Cichlidae](#), [Afrikai bölcsőszájúhalak](#), [Konings](#), [Maylandia estherae](#), [Vörös zebrasügér](#)

JELLEMZŐK:

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Írta: Liziczai Márk

Katalógusba került: 2012-08-28 09:01:17

Legutolsó frissítés: 2013-02-02 12:12:59

Katalógus ID: 4427

Oldal linkje: <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/bolcsoszaju-halak/afrikai-fajok/maylandia->

[estherae.html](#)

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva