

Melanotaenia herbertaxelrodi - Axelrod-szivárványhal

ELSŐ LEÍRÓJA:	Allen, 1981
CSALÁD:	Melanotaeniidae
MÉRET:	10 cm
C°:	22-26
pH°:	7-8
Nk°:	10-20
HELYIGÉNY:	160 liter
VISELKEDÉS:	békés, csapathal
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	középső - felső szint
ÉLETTARTAM:	5-6 év
TERM.VÉD.:	adathiányos



Melanotaenia herbertaxelrodi

Axelrod-szivárványhal

(Allen, 1981)

TOVÁBBI KÉPEK:

TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Melanotaenia herbertaxelrodi – Axelrod-szivárványhal elterjedési területe

(Distribution map)



Pápua Új-Guineáról származik, a Tebera-tó endemikus faja. Megtaláljuk ezen kívül még a Tebera-tóval összeköttetésben álló patakokban, kisebb folyókban és kapcsolódó tavakban is. Élőhelye esőerdővel borított hegyvidéki területen található, ahol a víz oxigéndús és vízinövényekben gazdag.

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

Rokonaihoz hasonlóan közepesen nyújtott, gabonaszemet formázó testű hal, viszonylag magas háttal. Feje kicsi, előreugró. Alapszínét az egész testét borító zöldes-aranysárga pikkelyek adják. Teste közepén egy viszonylag vaskos mélykék sáv húzódik. A sáv jellemzően, terjedelmének nagyobbik részén egy pikkelysört érint (ez egyedenként némileg változhat), ezt azért fontos kiemelni, mert a *Melanotaenia trifasciata* (ékszerkalászhál) faj egyes változatai meglehetősen emlékeztetnek az Axelrod – szivárványhalra, de a *M. trifasciata* esetében a hosszanti kék sáv jellemzően több, akár 2-3 pikkelysorra is kiterjed, vagy halvány kékes csíkok még futnak mellette. Bár az ékszerkalászhál rengeteg színváltozattal rendelkezik, több is nagyban hasonlít a *M. herbertaxelrod*-ra.

Fontos megkülönböztetési bélyeg továbbá, hogy a *M. herbertaxelrodi* farkúszója narancssárga, hát- és farok alatti úszói pedig jellemzően a test zöldessárga színét mutatják, esetleg enyhén erősebb narancsos színűek. Ezzel szemben az ékszerkalászhál vonatkozó változatainál a hát- és farok alatti úszók is erős narancsos, gyakran pirosas színűek! A nőstény Axelrod – szivárványhalak ezüstös alapszínűek, a hosszanti sáv rajtuk is feltűnik, illetve úszóik enyhébben pigmentáltak.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Egyik legszebb színeket öltő szivárványhalunk, az ehhez párosuló könnyű tartásmódja ideálissá teszi számos szobai akvárium számára. Mindenképpen csapatban tartsuk, ami legalább 6-8 példányt jelent. Egy ekkora állomány gondozására 160-180 literes medence már javasolt. Vizüket szűrjük alaposan, származási helyéből adódóan a kristálytisza és bomlástermékektől mentes vizet kedveli, de nem különösebben kényes hal. Ugrálós lehet, ezért akváriumát takarni kell. Magas az oxigénigénye, erre tartásakor, de különösen szállítása során ügyeljünk! Elfogadja a legtöbb száraz eleséget, érdemes magas karotinoid tartalommal bíró színtáppal is megkínálni, hogy lenyűgöző színeit megőrizhesse. Kedveli a rovarlárvákat, férgeket, apróbb rákokskákat, így az ezek nyújtotta kiegészítő táplálék lehetőségét ne vessük el, különösen kedvelik a vörös szúnyoglárvát, artémiát.

Jól társítható halak, békések, a legtöbb hasonló igényű fajjal társas akváriumban is nagyon jól kijönnek. Remek összeállításokat alkothatunk különböző szivárványhal-fajokkal történő társításával. Aktív, mozgékony halak, melyek előszeretettel úsznak az akvárium előterében. A háttérbe érdemes magasabb vízinövényekből egyfajta szegélynövényzetet ültetni, ami biztonságos búvóhelyet ad halainknak. Ágakkal dekorálhatunk, a sötét talaj pedig kiemeli pompás színeiket. A savas vizet nem viselik jól, és lehetőleg lágy vízbe se kerüljenek; a semleges – enyhén lúgos kémhatású, közepkemény víz ideális nekik. Csapvízben kiválóan tartható!

A hímek természetesebbek és jóval színesebbek is a nőstényeknél, így megkülönböztetésük nem nehéz feladat. Szaporításuk nagyban hasonlít a többi rokon fajéhoz, nem kifejezetten bonyolult. Egy betelt nőstényt válasszunk ki szép színeket produkáló hím társa mellé, és helyezzük őket egy kb. 7,5-ös pH-jú, 10-15 nk-s vízbe. A tenyésztéshez érdemes 25-26 C körüli hőmérsékletet alkalmazni, de tartására akár a

fűtetlen szobai medence is megfelelhet, hiszen hegyvidéki területről származó halról van szó. Elnyújtottan ívnak, a tenyészmedencét is szűrni, levegőztetni kell. Béleljük ki a medence alját perlonvattával, jávai mohával vagy helyezzünk be mesterséges ikráztató csomót (ezt kalászhalféléknél gyakran használjuk). A biztonság kedvéért ikrarácsot is betehetünk, mivel fogyaszthatnak ikráikból. Naponta ellenőrizzük, és vegyük el a már lerakott ikrákat. A szülők akár egy héten át is ívhatnak. A kishalak 1-1,5 hét alatt kelnek ki, további pár nap kell elúszásukig, mely után frissen kelt artémia naupliákkal indíthatóak. A szétnövésre és a friss, jó minőségű vízre ügyeljünk. Aránylag lassan fejlődnek, hónapokig tart, mire elérik kifejtett színeiket.

Gerald Allen és Brian Parkinson 1980 szeptemberében gyűjtötte be e fajt, s ezután nem sokkal már az akvarisztikában is megjelentek. A híres, 2017-ben elhunyt Herbert R. Axelrod után került elnevezésre. Sajnos az IUCN még nem tudta kellő alapossággal felmérni természetes populációit, ezért egyelőre adathiányosnak tekintett természetvédelmi státusza, de számos kutató vélekedik úgy, hogy a faj valójában már veszélyeztetett. Ebben közrejátszik a túlhalászat is, illetve az, hogy elterjedési területe szűk, kevés kis populációt leszámítva szinte csak a Tebera – tóra korlátozódik.

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

Tebera-tavi szivárványhal

syn:-.

Eng: Lake Tebera Rainbowfish, Yellow Rainbowfish.

Egyéb köznevei: Gylden regnbuefisk, Kultasateenkaarikala, Lake Tebera-Regenbogenfisch.

KATEGÓRIÁK:

[Akváriumi halak](#), [Kalászhalak](#)

KULCSSZAVAK:

[Akváriumi halak](#), [Kalászhalak](#), [akvarisztika](#), [Melanotaeniidae](#), [Allen, 1981](#), [Axelrod - kalászhal](#), [Melanotaenia herbertaxelrodi](#)

JELLEMZŐK:

[nagyon aktív mozgású](#), [féllúgos \(7.5-8 pH\)](#), [közepesen aktív mozgású](#), [békés rajhal](#), [hőigényes \(25-30 °C\)](#), [mindenevő](#), [Ausztrália](#), [normál \(6.5-7.5 pH\)](#), [középső szint](#), [Észak-Ausztrália](#), [felső szint](#), [átlagos élethossza 3-6 év](#), [közepes méretű 5-10 cm](#), [átlagos növényzetigényű](#), [közepes hőigényű 20-25°C](#), [keményvízi 15-20°Nk](#), [Új-Guinea](#), [átlátszó vízi](#), [sűrű növényzetigényű](#), [közepesen keményvízi 10-15°Nk](#), [normálméretű akvárium 100-200 literig](#), [közepesen áramló vízi](#), [állóvízi](#), [lassan mozgó vízi](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

- <http://rainbowfish.angfaqlld.org.au/Haxel.htm>
- <http://www.seriouslyfish.com/species/melanotaenia-herbertaxelrodi/>

Írta: Liziczai Márk

Katalógusba került: 2009-09-14 09:01:17

Legutolsó frissítés: 2018-01-30 11:16:24

Katalógus ID: 4288

Oldal linkje: <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/kalaszhalak/melanotaenia-herbertaxelrodi.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva