

Metynnis hypsauchen - Schreitmüller tányérlazac

ELSŐ LEÍRÓJA:	Müller, 1844
CSALÁD:	Serrasalminidae
MÉRET:	14 cm
C°:	24,0-28,0
pH°:	6.0-7.0
Nk°:	4,0-10
HELYIGÉNY:	200 liter
VISELKEDÉS:	békés
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	összes szint
ÉLETTARTAM:	5-8 év
TERM.VÉD.:	nem értékelt



Metynnis hypsauchen
Schreitmüller tányérlazac
 (Müller, 1844)

TOVÁBBI KÉPEK:

Képek feltöltés alatt!

TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Metynnis hypsauchen – Schreitmüller tányérlazac elterjedési területe (Map)

Az Amazonas-medence, Guyana és Paraguay folyói.

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

A hal testének hossza és magassága kb. egyenlő, alakja olyan, mint egy paralelogramma. A hátoldal kissé kicsúcsosodik, a hasoldal élszerű. Ezüstszínű oldalán véletlenszerűen sötét pontok fordulnak elő, és alig látható, függőleges csíkok is lehetnek rajta.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Ez a tányérlazacfaj szereti a visszafogott világítást és sötét talajt. Kissé félnék, de gyönyörű faj, mely legjobban az akvárium sötétebb régióit kedveli, bőven elegendő fényt jelent számára a tartószoba

megvilágítása. Ahhoz, hogy elvonjuk figyelmét akváriumai növényeinkről, rengeteg különféle növényi alapú élelmet etessünk velük, mint a spirulina pellet vagy pehely, saláta (enyhén gőzöve, majd lehűtve) vagy bármilyen más általunk kiötlött növényi táplálék (pl. fejtett borsó). Ezeken kívül fogyaszt állati eredetű táplálékot is, mint a vér, férgek és különféle szúnyoglárva, tubifex stb. Ikrarakó és tenyésztése nem könnyű. Nagyobb akváriumban tartva, a hőmérsékletet kb. 28-30 °C-ra emelve, a hím és a nőstény a rajból kitörve forrasmo, vagy egyéb ikrázatonövényre szórja kb. 2 mm nagyságú, nemragadós ikráit, melyek száma akár több ezer is lehet. A kicsinyek elúszásuk után a legapróbb élőlesekre, majd ahogy nőnek egyre nagyobb méretű eledelre vadásznak. Megfelelő táplálás mellett a 4. héten kb. 2 cm-esek lesznek.

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: *Metynnis schreitmulleri*, *Metynnis calichromus*, *Metynnis calichromus schreitmulleri*, *Metynnis ehrhardti*, *Metynnis hypsauchen fasciatus*, *Metynnis orinocensis*, *Myletes hypsauchen*, *Myletes orinocensis*.

Eng: Silver dollar, Plain metynnis, Schreitmuller's metynnis.

Egyéb köznevei: Almindelig skivekarpelaks, Levytetra, Dickopf-Scheibensalmler, Gestreifter, Scheibensalmler, Schreitmüllers, Scheibensalmler, Plaskoboc tepoglowy, Pacu, Pacu-marreca, Pacupeba, Palometa.

KATEGÓRIÁK:

[Pontylazacok](#), [Akváriumi halak](#)

KULCSSZAVAK:

[Schreitmüller tányérlazac](#), [1844](#), [Akváriumi halak](#), [Pontylazacok](#), [akvarisztika](#), [Müller](#), [Serrasalimidae](#), [Metynnis hypsauchen](#)

JELLEMZŐK:

[Orinoco](#), [lassan mozgó vízi](#), [Guyanák](#), [nagy \(több 200 liternél\)](#), [közepesen aktív mozgású](#), [békés rajhal](#), [félsavas \(6-6.5 pH\)](#), [mindenevő](#), [hosszú életű 6 év fölött](#), [hőigényes \(25-30 °C\)](#), [középső szint](#), [normál \(6.5-7.5 pH\)](#), [felső szint](#), [Kelet-Dél-Amerika](#), [alsó szint](#), [átlagos növényzetigényű](#), [igenlágymvízi \(0-5°Nk\)](#), [nagy méretű 10-20 cm](#), [Paraguay](#), [Amerika](#), [lágymvízi \(5-10 Nk°\)](#), [Amazónia](#), [közepes hőigényű 20-25°C](#), [barna vízi](#), [átlátszó vízi](#), [Dél-amerika](#), [közepesen áramló vízi](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Írta: Honffy Gábor

Katalógusba került: 2008-05-12 09:01:16

Legutolsó frissítés: 2013-08-13 04:20:55

Katalógus ID: 4038

Oldal linkje: <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/pontylazacok/metynnis-hypsauchen.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva