

Microctenopoma fasciolatum - Díszes bozóthal

ELSŐ LEÍRÓJA:	Boulenger, 1899
CSALÁD:	Anabantidae
MÉRET:	8 cm
C°:	24-28
pH°:	6,5-7,5
Nk°:	4-15
HELYIGÉNY:	100 liter
VISELKEDÉS:	viszonylag békés
TÁPLÁLÉK:	ragadozó
TARTÓZKODIK?	összes szint
ÉLETTARTAM:	5-8 év
TERM.VÉD.:	nem fenyegetett



Microctenopoma fasciolatum

Díszes bozóthal

(Boulenger, 1899)

TOVÁBBI KÉPEK:



TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Microctenopoma fasciolatum – Díszes bozóthal elterjedési területe

(Distribution map)

Nyugat-Afrika trópusi övezete, A Kongó folyásvidékének felső szakaszát leszámítva a többi területen elterjedt. Megtaláljuk a Közép-Afrikai Köztársaságban, Kongóban és a Kongói Demokratikus Köztársaságban, valamint Kamerunban is. A többi bozóthalhoz hasonlóan kedveli a dús növényzetű vizeket.

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

Hengeres testű, hegyes fejű, robusztus labirinthalak. A hát- illetve hasoldali úszók megnyúltak, hegyesen végződnek (kiváltképp a hímeknél). Rendkívül hasonlít a *Microctenopoma congicum* fajra, megkülönböztetésük első ránézésre nem egyszerű, de néhány karakterisztikus jelleg segítségünkre lehet.

A díszes bozóthal alapszínezete ezüstös, rajta a sötétszürke-fekete sávok cikk-cakkszerűen futnak le. Egyes idősebb hím példányok háta, sőt akár törzse nagy része is sötétre válhat, a csíkozottság kevésbé dominál. Ezzel szemben a kongói bozóthal szintén ezüstös testén sokkal egyenesebb, határozottabb sávok futnak.

A díszes bozóthalak úszói jellemzően fekete alapúak, de szélük már teljesen acélkék. Az úszók mintáját fontos alaposan szemügyre vennünk. Bár az összes úszó hasonlóan mintázott, legjobb támpont a farkúszó. A kék szín ugyanis az úszósugarak mentén, kis foltokká szedődve indul, majd csak az úszók külső szegélyén válik dominánssá. A kongói kúszóhalak esetében ez nem így van. Ott a farkúszón az úszósugár teljes hosszában, egyenletesen kék, a hát- és farok alatti úszón pedig a kék alapszínen az úszósugarak feketék, követve a test mintáját!

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Rendkívül dekoratív, mutatós bozóthalfaj. Az akvaristák által viszonylag keresett, de sajnos nem túl gyakori a kereskedésekben. Sokszor tévesen azonosítják a *Microctenopoma congicum*mal, vagy felcserélik elnevezéseiket, de a valódi *M. congicum*ok csak elvétve kerülnek az akváriumokba, nagyrészt ez a faj szerezhető be.

Némi akvarista gyakorlat megszerztével a faj már különösebb problémák nélkül gondozható. Méretéből és táplálkozásmódjából fakadóan az apróbb termetű társhalakat elfogyaszthatja, de ha megfelelő méretűek lakótársai, velük szemben teljesen békésen viselkedik. Legalább 100 literes férőhelyre van szüksége egy párnak, ha több egyedet szeretnénk gondozni, kicsit nagyobb medencét szerezzünk be. A hímek, kivált ívási időszakban teritoriálisak lehetnek. Jól együtt tarthatóak más afrikai halakkal, mint például kongólazacokkal, elefánthallal, pillangóhallal, békésebb tollasbajszú harcsákkal, de egyfajos módon is tarthatjuk őket. Félénk, bújós természetűek, különösen, ha még nem szokták meg helyüket. Ahogy nőnek és bátorodnak, egyre többször mutatkoznak az akvárium előterében is, ahol jól megfigyelhetjük őket. Akváriuma mindenképpen legyen csendes helyre állítva, és dúsan növényesítve. Tompított világítást, úszónövényeket használjunk. Legyenek halaink számára búvóhelyek, barlangok, alámerített gyökerek. Természethű tájat varázsolhatunk az aljzatra szórt falevelek felhasználásával.

Átlagos szűrésű medence megfelel számára, 25-26 °C körüli tartóhőmérséklet javasolható. Lágyabb, semleges közeli (vagy enyhén savanyú) tartóvizet töltsünk medencéjébe. Célszerű élő és fagyasztott

táplálékokat használunk, kedvelik a szúnyoglárvát, artémiát, tubifexet, grindált, blackwormot. A nagyobb példányok kaphatnak kisebb garnélákat, apró halakat, földigilisztát is. Szoktatás után a száraz tápok is elfogadják, de néha problémás lehet, mire halaink ráállnak erre a tápláléktípusra. Bár jobbra ragadozók, néha kaphatnak némi növényi eredetű táplálékot is, ami segíti a vitamindús étrend megvalósítását.

Az ivarok megkülönböztetése a hím megnyúlt úszói és élénk színei alapján a lehetséges, a nőtény jóval kevésbé mintázott. Tenyésztésük nem tartozik a könnyű feladatok közé. A szaporítómedence legyen növényekkel dúsan teleültetett, helyezünk be sok úszónövényt. Az akváriumot szűrővel is el kell látnunk, de ez ne keltsen számottevő áramlást. Az akvárium kerüljön nem zargatott, félhomályos helyre. A víz legyen enyhén savas, meglehetősen lágy és a hőmérsékletet emeljük kb. 28 °C-ra. A legszebb hímet a legkerekebb nőténnyel pároztassuk, ívatás előtt bőséges jó minőségű táplálékot kapjanak! Gyakran a hím csak hosszú idő után, vonakodva építi meg a habfészket, és az ívásig további jópár nap is eltelhet. Az ívás akár napokon át is elhúzódhat, de egyszerre is lerakhatják ikráikat, melyek száma nem ritkán az 1000-ret is eléri. A szülők vigyáznak az ikrákra, melyek 18-20 órán belül ki is kelnek, s két napon belül már megkezdik a táplálkozást az ivadékok. Mivel még nagyon kicsik, ezért csak parányi, infuzória méretű eleséggel indíthatjuk őket. Rendszeres vízcserék és bőséges táplálás mellett rendkívül gyors a fejlődésük, 2 hónapos korukra elérik a 1,5 cm-es hosszt és mutatják a csíkos mintájukat. A szétnövésre ügyeljünk!

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: *Anabas fasciolata*, *Ctenopoma fasciolatum*, *Anabas fasciolatus filamentosa*.

Eng: Banded Climbing Perch, Banded Ctenopoma.

Egyéb köznevei: Stribet buskfisk, Raitakiipi jakala, Gebänderter Buschfisch.

KATEGÓRIÁK:

[Akváriumi halak](#), [Labirintkopoltyús halak](#)

KULCSSZAVAK:

[1899](#), [Anabantidae](#), [Mászó- és Labirinthalak](#), [Kongói kúszóhal](#), [Microctenopoma fasciolatum](#), [Akváriumi halak](#), [akvarisztika](#), [Boulenger](#)

JELLEMZŐK:

[felső szint](#), [Közép-Afrika](#), [lágyvízi \(5-10 Nk°\)](#), [átlagos élethossza 3-6 év](#), [közepes hőigényű \(20-25°C\)](#), [lassú mozgású](#), [bújós](#), [közepesen keményvízi \(10-15°Nk\)](#), [sűrű növényzetigényű](#), [normálméretű akvárium \(100-200 literig\)](#), [ragadozó](#), [barna vízi](#), [sárga vízi](#), [hosszú életű 6 év fölött](#), [hőigényes \(25-30 °C\)](#), [Afrika](#), [alsó szint](#), [közepes méretű 5-10 cm](#), [békés viselkedés](#), [lassan mozgó vízi](#), [Kongó](#), [igenlágyvízi \(0-5°Nk\)](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

- Horst Linke: **Labyrinthfische**
- Frank Schäfer: **All Labyrinths**
- Hans Frey: **Az akvarista kislexikona**

Írta: Liziczai Márk

Katalógusba került: 2008-05-19 09:01:16

Legutolsó frissítés: 2018-08-28 14:12:56

Katalógus ID: 4254

Oldal linkje: <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/labirintkopoltyus-halak/microctenopoma-fasciolatum.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva