

Micronemacheilus cruciatus - Vietnámi törpecsík

ELSŐ LEÍRÓJA:	Rendahl, 1944
CSALÁD:	Nemacheilidae
MÉRET:	3,5 cm
C°:	22-26
pH°:	6-7,5
Nk°:	5-15
HELYIGÉNY:	50 liter
VISELKEDÉS:	erősen társas
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	alsó-középső szint
ÉLETTARTAM:	3-5 év
TERM.VÉD.:	gyakori



Micronemacheilus cruciatus

Vietnámi törpecsík
(Rendahl, 1944)

TOVÁBBI KÉPEK:



TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Micronemacheilus cruciatus – Vietnámi törpecsík map

Kizárólag Vietnamban fordul elő, endemikus faj.
Az An Lao és Phong Nha folyók vízbaszából,
illetve környékéről ismert. Lassúbb folyású,
nyugodt szakaszok lakója, ahol a növényzet sűrű, a
talaj homokos vagy kavicsos.

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

Karcsú, kissé nyújtott testű, torpedó alakú halak. Szemük viszonylag nagy, szájukat 3 pár bajuszszál szegélyezi. Alapszínezetük ezüstös, hátuk enyhén barnás. Néha fénylően világos testüket nagyon sok függőleges irányú keresztsáv tarkítja, melyek sötétszürkés-barnás árnyalatúak. A csíkok a farktőnél indulnak, ahol egy nagy sötét foltot is találunk, és egészen a fejig húzódnak. Úszói színtelenek.

Stresszszínezetük során a harántsávok elhalványodnak, gyengén kivehetőek, helyettük egy oldalvonal menti hosszanti sötét csík látható, s alapszínük is barnább árnyalatúra vált. A hosszanti sáv egyébként néha – hangulatfüggően – megfigyelhető rajtuk olyan esetben is, amikor stresszhelyzet nem vagy alig áll fenn.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

A vietnámi törpecsíkok kisméretű, nappal is aktív csíkfélék. Egy kisebb akvárium, sőt akár a nagyobbacska nano stílusú medencék is megfelelnek tartására, 50 litertől már jól érzik magukat. Kifejletten sem érnek el 3,5 cm-nél jelentősen nagyobb méretet. A vietnámi törpecsíkok rendkívül szociális élőlények, nagy csapatban élnek, ezért akváiumi tartásuk során is minimum 6-8, de inkább 10 vagy több példányukat érdemes tartani. Érdemes megfigyelnünk, ahogy a halak egymással szórakoznak, játékosan mozognak és aktív közösségi életet élnek. Szintén érdekesség viselkedésükben, hogy nagyon sokat úsznak vízközt, az akvárium középső zónájában. Bár természetesen a talajon is tartózkodnak, ez a fajta életmód nagyban eltér a legtöbb csíkfélétől. Úszásmódjuk sokszor ugrándozó, kisebb megírámodásokkal tarkított. Szívesen pihennek növények levelein, ágak között. Úszónövényekkel akár árnyékolhatjuk is a világítást, a tompa, szűrt fényt jobban kedvelik.

A medence aljára apró szemű homokot, soder terítsünk, ami nem sérti fel bajuszszálaikat, esetleg lekerekített köveket használjunk. Bátran dekorálhatunk nagyobb sziklákkal, ágakkal, de érdemes dús növényzetet ültetnünk, ami természetes élőhelyükre emlékezteti a halakat. Az áramlás lehetőleg ne legyen intenzív, s bár folyami halak, a viszonylag csendes, lassan mozgó, partközeli szakaszokat kedvelik. Igényeiknél fogva a legtöbb társas akváriumba alkalmasak, hiszen a semleges kémhatású, kissé lágy – enyhén kemény víz számos közönséges díszhalunknak megfelel. A túl meleg vizet nem kedvelik, de az általános 24-26 °C alkalmas tartásukra. Nem jelent viszont problémát, ha fűtetlen szobai medencébe kerülnek, esetleg olyan társításba, ahol hidegebb vizet kedvelő halak élnek (pl.: palacsinta algázók, egyes dánió fajok), az alacsonyabb 21-22 °C körüli hőmérséklet is alkalmas számukra. Csak beállt biológiai egyensúlyú akváriumba telepítsük őket, a rendszeres vízcseréket tartsuk be. Ügyeljünk arra, hogy a frissen importált példányok nagyobb odafigyelést igényelnek beszoktatásuk alatt, de később strapabíró állatokká válnak.

Társításuk nem nehéz, hiszen teljesen békések még a legapróbb testű halakkal is, éppen ezért akár egy nano akvárium fajösszetételének kiegészítője is lehet. Arra ügyeljünk, hogy olyan társhalak ne kerüljenek mellé, melyek kárt tehetnek benne. Leginkább kisebb dániókkal, razbórákkal, kistestű gurámikkal (pl.: mézgurámi, morgó gurámi) vagy más békés talajlakókkal érdemes együtt tartanunk őket. Etetésük szintén nem bonyolult, nagyon hamar elfogadják a műeleségeket is, szívesen táplálkoznak gyorsan megpuhuló vagy szemcsesedő, talajra süllyedő tablettákból, de akár vízközt is fogyasztanak a lehulló lemezes eledel darabkáiból. Egyébként hasznos lakói az akváriumnak abból a szempontból is, hogy gyorsan eltüntetik a más halak által meghagyott eleséget (ez természetesen nem elég táplálék nekik), ügyes takarítók. Egyes tévhitekkel ellentétben algát nem fogyasztanak! Menüjüket érdemes kiegészíteni fagyasztott, esetleg élő tápokkal is, úgy, mint a szűnyoglárva, artémia, tubifex vagy grindál.

Az akváriumokba kerülő vietnámi törpecsíkok döntő többsége vadon fogott, a természetben begyűjtött példány. Rendszeresített akváriumi tenyésztésük nem bevett gyakorlat, holott a csíkfélék azon kisebb hányadához tartoznak, melyek egész jól szaporíthatók akváriumban is. Ehhez mindenképp egy nagy csapatra lesz szükségünk, melyeket alaposan kondicionálunk jóféle eleségekkel, lehetőleg minél több élő tartalommal. A csapat egyedszáma sikeres tenyésztők tapasztalatai alapján érje el akár a 20 egyedet is! Az ivarok megkülönböztetése nem egyszerű, a nőstények jellemzően kicsit teltebbek. Ha a nagyszámú csapatot együtt tartjuk egy vízínövényekkel, mohákkal sűrűn telepített akváriumban, akkor számíthatunk felcseperedő ivadékokra. A hatékonyabb szaporítás érdekében érdemes egy kisebb akváriumot feltöltenünk már beállt vízzel, és jó alaposan kibélelni jávai mohával vagy más ikráztató növényvel. Ide párban is kirakhatók a halak, de akár csapatban is. Az ívás után a szülőket el kell távolítani, mert ikrafalók. A medencébe vezessünk levegőztetést, fűtenünk nem kell. Az ívás alatt szűrünk sem muszáj, de az ivadékevelésnél ez már elengedhetetlen. Az utódok rendkívül aprók, rotatóriával, papucsállatkával indíthatóak, a frissen kelt artémiát csak később tudják megenni.

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

sokcsíkú törpecsík, vietnami sziklanyaló

syn: *Yunnanilus cruciatus*, *Nemacheilus cruciatus*.

Eng: Vietnamese multi-banded zebra loach, Hovering zebra loach.

Egyéb köznevei: Tiger-Zwergschmerle, Mřenka annamská, Tihevööt-hiinatrull.

KATEGÓRIÁK:

[Akváriumi halak](#), [Csíkfélék](#)

KULCSSZAVAK:

[Csíkfélék](#), [Vietnámi törpecsík](#), [Nemacheilidae](#), [Rendahl](#), [Akváriumi halak](#), [1944](#), [Micronemacheilus cruciatus](#)

JELLEMZŐK:

[átlagos élethossza 3-6 év](#), [sűrű növényzetigényű](#), [nagy méretű 10-20 cm](#), [barna vízi](#), [félsavas \(6-6.5 pH\)](#), [Ázsia](#), [hőigényes \(25-30 °C\)](#), [Dél-Ázsia](#), [alsó szint](#), [sárga vízi](#), [lágynyízi \(5-10 Nk°\)](#), [békés rajhal](#), [közepes hőigényű \(20-25°C\)](#), [lassan mozgó vízi](#), [Indokína](#), [közepesen keményvízi \(10-15°Nk\)](#), [közepesen aktív mozgású](#), [Vietnám](#), [kisméretű akvárium \(50 literig\)](#), [mindenevő](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

- Gerhard Ott: **Schmerlen**
- www.iucnredlist.org/details/188008/0
- www.seriouslyfish.com/species/micronemacheilus-cruciatus/
- www.loaches.com/species-index/yunnanilus-cruciatus

Írta: Liziczai Márk

Katalógusba került: 2018-08-06 11:02:26

Legutolsó frissítés: 2018-08-06 14:25:41

Katalógus ID: 9402

Oldal linkje: <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/csikfelek/micronemacheilus-cruciatus-vietnami-torpecsik.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva