

Mimagoniates inequality - Szélesfarkú kéklazac

ELSŐ LEÍRÓJA:	Eigenmann, 1911
CSALÁD:	Characidae
MÉRET:	6,5-4 cm
C°:	19,0-23,0
pH°:	5,5-6,5
Nk°:	3,0-6
HELYIGÉNY:	100 liter
VISELKEDÉS:	békés, csapathal
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	összes szint
ÉLETTARTAM:	5-8 év
TERM.VÉD.:	nem értékel



Mimagoniates inequality

Szélesfarkú kéklazac

(Eigenmann, 1911)

TOVÁBBI KÉPEK:



TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Mimagoniates inequality - Szélesfarkú kéklazac elterjedési területe (Map)

Dél-Amerika; Brazíliában a *Jacuí* folyó alsófolyásába ömlő feketevizű mellékfolyóiban és a *Rio Grande do Sul* folyóba csatlakozó ugyancsak feketevizű patakokban és mocsarakban honos.

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

Nyúlánkak, oldalt lapított. Hátúszója valamivel a testközép mögött kezdődik, zsírúszója jól fejlett. Oldalvonala nem teljes. A kopolyúk fölötti üregben járulékos légzőszerv van, amellyel a halak külső levegőt is képesek felhasználni. A nőtények ezenkívül pikkelyekből képződött, mirigyszerű tasakot viselnek farkúszójuk kezdetén, amelynek valószínűleg a párzásban van jelentősége.

A hím 6 cm-ig, a nőstény 4,5 cm-ig növekszik.

Fémesen kék, ill. zöld színű, ezüstös csillogású, a szem fölött élénkvörös csík van, úszói nagyon szépek. A hím színei élénkebbek, úszói fejlettebbek.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Mozgékony, mutatós faj, békés, az akváriumot jól bírja. Mozgékonyására való tekintettel nem szabad kicsiny tartályba tenni.

A hőmérsékletet illetően nem különösebben igényes, 18— 22 C°, tenyésztéskor kb. 24 C° megfelelő. A magasabb hőmérséklet hátrányos hatású. Külső levegőt úgy vesz, hogy villámgyorsan a felszínre úszik, s az elhasznált levegőt kopolyúfedőinek felemelése után kilöki. Ez elég jól hallható hanggal jár, amit különösen a szép nászjátékok folyamán gyakran hallhatunk.

A hím nagyon élénk, furcsa rángatózó mozdulatokat végez. Valószínűleg eközben megy végbe a megtermékenyítés. Az igazi ivás röviddel ezután, a hím részvétele nélkül folyik le. A petéket a nőstény többnyire széles levelű növények alá ragasztja, azokat a leveleket részesítve előnyben, amelyek a felszín közelében vannak. Az 1 mm nagyságú peték száma mintegy 70, 36— 48 óra alatt fejlődnek ki. Az ivadékok 2 napig még növényeken és az üvegtáblákon lógnak, mielőtt szabadon úsznának. Igen falánkok, de gyors növésűek is, úgyhogy 3— 4 hónap múlva már ivarérettek lehetnek.

A videón egy másik *Mimagoniates* faj látható ivás közben.

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: *Glandulocauda inequalis*.

Eng: Croaking tetra, Tetra.

Egyéb köznevei: Bredhalet tetra, Kurnutetra, Viuhkatetra, Breitschwanzsalmmler, Quakender Tetra, Lumbari, Mojarra, Bredstjärttetra.

KATEGÓRIÁK:

[Pontylazacok](#), [Akváriumi halak](#)

KULCSSZAVAK:

[Characidae](#), [Pontylazacok](#), [Akváriumi halak](#), [Mimagoniates inequalis](#), [akvarisztika](#), [Eigenmann](#), [Szélesfarkú kéklazac](#), [1911](#)

JELLEMZŐK:

[átlátszó vízi](#), [gyors vízáramlású](#), [alsó szint](#), [közepesen áramló vízi](#), [békés rajhal](#), [igenlágyművi \(0-5°Nk\)](#), [mindenevő](#), [hosszú életű 6 év fölött](#), [lágyművi \(5-10 Nk°\)](#), [felső szint](#), [fekete vízi](#), [közepes hőigényű \(20-25°C\)](#), [átlagos növényzetigényű](#), [normálméretű akvárium \(100-200 literig\)](#), [Amazónia](#), [Kelet-Dél-Amerika](#), [barna vízi](#), [Dél-amerika](#), [Amerika](#), [félsavas \(6-6.5 pH\)](#), [közepes méretű 5-10 cm](#), [nagyon aktív mozgású](#), [savas \(6pH alatt\)](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Írta: Honffy Gábor

Katalógusba került: 2010-12-06 09:01:17

Legutolsó frissítés: 2018-05-27 08:30:12

Katalógus ID: 4321

Oldal linkje: <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/pontylazacok/mimagoniates-inequalis.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva