

Myriophyllum spicatum - Füzéres süllőhínár

ELSŐ LEÍRÓJA:	Linné
CSALÁD:	Haloragaceae
MAGASSÁGA:	70-300 cm
C°:	18-25
pH°:	6-8
Nk°:	3-25
HELYIGÉNY:	55 liter
TALAJTÍPUS:	egyszerű mosott kavics, homok
TÁPANYAG:	közepes, gyökerén és levelén
ÜLTETÉS:	középső-hátsó zóna
FÉNYIGÉNYE:	közepes
TERM.VÉD.:	gyakori



Myriophyllum spicatum
Füzéres süllőhínár
 (Linné)

TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Térkép még nem készült az adatlaphoz, feltöltése folyamatban!

Ausztrália és Dél-Amerika kivételével minden más földrészen megtalálható, még brackvizekben is előfordulhat. Észak-Amerikába mesterséges úton jutott el.

Magyarországon is őshonos, nálunk főleg a mélyebb állóvizekben gyakori. A Balatonban a hínáros békaszőlővel (*Potamogeton perfoliatus*) együtt nagy hínártelepeket alkot.

TOVÁBBI KÉPEK:



KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

Fésűszerűen tollas levelei 3,5 cm hosszúak. A levelek négyesével alkotnak örvöt. Emers hajtásain a pirosas, kívül épszelű csésze-levelekkel takart apró virágai füzérben állnak. Szára néhány mm vastag, törékeny.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Kozmopolita faj, bár trópusokon is előfordul, élőhelyeinek jelentős része a mérsékelt égövbe esik. Éppen ezért inkább hidegvízi akváriumokba való, meleg vízben hosszabb-rövidebb ideig tartható csak meg. Akváriumokon kívül kerti tavakba is ültethető. Ha tóban tartjuk, akkor általában az ősz folyamán tönkremegy, de gyökérrendszere még a téli fagyot is túlélheti, s ebből következő évben újra kihajt.

Akváriumokban tenyésztők is előszeretettel használják, remek búvóhelyet nyújt például elevenszülő fogaspontyok ivadékainak. Fényigénye nem olyan magas, mint némely rokonáé, közepes megvilágítottsággal már megelégszik. Külön tápozást nem igényel, enélkül is aránylag jó ütemben nő. A kemény vizet is jól tolerálja, akárcsak a pH-érték szélsőbb viszonyait (a lúgosabb vízben is jól érzi magát). Enyhén sótűrő, így egyes helyeken brackvizekben is előfordul. Ügyeljünk rá, hogy a növényevő halak megcsipkedhetik, az erősen talajtűrő halak pedig kitúrhatják töveit.

Érdemes visszametszeni, ha túlnövekedik, a levágott hajtásrészletekből szaporítható. A természetben gyakran megfigyelhető olyan helyeken, ahol a víznek magas az oldott nitrát, nitrit vagy foszfáttartalma. E káros anyagok felhasználásával segíti a vizek tisztulását és táplálékkonkurensé számos algafajnak.

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

Népies elnevezései: süllőfű, tókefe, vízi kapor, tóborosta

syn: -

Eng: Eurasian water-milfoil, Spike water-milfoil.

Egyéb köznevei: Stolístek klasnatý, Myriophylle en épis, Ähriges Tausendblatt, Akstusenblad.

KATEGÓRIÁK:

[Akváriumi növények](#), [Kozmopolita fajok](#)

KULCSSZAVAK:

[Akváriumi növények](#), [Haloragaceae](#), [akvarisztika](#), [Füzéres süllőhínár](#), [Myriophyllum spicatum](#), [Kozmopolita fajok](#), [Linné](#)

JELLEMZŐK:

[Közép-Afrika](#), [gyöngykavics talaj](#), [állóvízi](#), [Japán](#), [közepesen keményvízi \(10-15°Nk\)](#), [Kelet-Ázsia](#), [Niger](#), [közepes tápanyagigényű](#), [barna vízi](#), [hidegvízű élőhelyek](#), [keményvízi \(15-20 Nk°\)](#), [Kína](#), [fállúgos \(7.5-8 pH\)](#), [Zambézi](#), [Ázsia](#), [Észak-Ázsia](#), [közepesméretű akvárium \(50-100 literig\)](#), [Vietnám](#), [fellsavas \(6-6.5 pH\)](#), [Myanmar](#), [nagy \(50-100 cm\)](#), [Dél-Ázsia](#), [Egyéb nagy tavak](#), [India](#), [gyors növekedésű](#), [Arab-félsziget](#), [Indonézia](#), [Észak-Európa](#), [Nyugat-Ázsia](#), [közepesen fényigényes \(500-1000 lux\)](#), [Közép-Amerika](#), [Észak-Afrika](#), [Szumátra](#), [Kelet-Európa](#), [Pakisztán](#), [középső zónába ültetendő](#), [trópusi](#), [Kelet-Afrika](#), [nagyon keményvízi \(20-30°Nk\)](#), [ÉA-trópusi](#), [Nyugat-Európa](#), [Afrika](#), [átlátszó vízi](#), [Dél-Európa](#), [igenlággyvízi \(0-5°Nk\)](#), [Észak-Amerika](#), [óriás \(nagyobb 100 cm-nél\)](#), [Atlanti országok](#), [lággy levél és szár](#), [közepesen áramló vízi](#), [Európa](#), [lággyvízi \(5-10 Nk°\)](#), [tengerparti](#), [kvarchomok talaj](#), [Nyugat-Afrika](#), [lassan mozgó vízi](#), [Dél-Afrika](#), [hidegvízű élőhelyek \(5-20°C\)](#), [sárga vízi](#), [sóder talaj](#), [Kongó](#), [mérsékelt tápanyagigényű](#), [magashegyi](#), [Fülöp-szigetek](#), [közepes hőigényű \(20-25°C\)](#), [Indokína](#), [hátsó zónába ültetendő](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

<http://www.iucnredlist.org/details/164481/0>

https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%BCz%C3%A9res_s%C3%BCII%C5%91h%C3%ADn%C3%A1r

<http://nas.er.usgs.gov/queries/greatlakes/FactSheet.aspx?SpeciesID=237>

<https://en.aqua-fish.net/plants/myriophyllum-spicatum>

Beküldte: gabrinus

Katalógusba került: 2011-01-29 14:19:04

Legutolsó frissítés: 2018-03-26 10:11:01

Katalógus ID: 4996

Oldal linkje: <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-novenyek/kozmosopolita-fajok/myriophyllum-spicatum.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva