

Nannacara anomala - Színes törpesügér


ELSŐ LEÍRÓJA:	Regan, 1905
CSALÁD:	Cichlidae
MÉRET:	7 cm
C°:	22,0-25,0
pH°:	6,0-8,0
Nk°:	5,0-19
HELYIGÉNY:	80 liter
VISELKEDÉS:	társas
TÁPLÁLÉK:	ragadozó, mindenevő
TARTÓZKODIK?	alsó szint
ÉLETTARTAM:	5-8 év
TERM.VÉD.:	nem értékel



Nannacara anomala

Színes törpesügér
(Regan, 1905)

TOVÁBBI KÉPEK:



TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Térkép még nem készült az adatlaphoz, feltöltése folyamatban!

Az úgynevezett szavanna-creekekben, folyók oldalágaiban és egyéb kisebb vizekben Guayana területén.

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

A zömök testű hal színe általában aranybarna, oldalán a pikkelyek zöldeskék színben játszanak. Hangulatától függően, sötétebb mintázat jelenhet meg rajta. A kerek fejen nagy, arany színű szemek és zöldeskék mintázat van. A nőstények egyszínű sárgák. Hosszúsága: 7— 8 cm, a nőstény jóval rövidebb. A hím zöldes vagy bronzszínű. Minden egyes pikkelyen sötétbarna folt látható. A hátúszó kék, a széle porcelánfehér és vörös szegélye van. A nőstény szürkessárga vagy okker színű. Az alapszíntől világosan elválík a rajzolat, amely keresztsávokkal összekötött két fekete hosszanti csíkból áll. A rajzolat együttesen

sakktáblászerű mintát ad. Feltehető, hogy a mintának riasztó, de egyúttal jel szerepe is van. A torok és a has izgalmi állapotban gyakran sötétfeketére színeződik.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

A Bölcsőszájú halfélék (Cichlidae) családjába tartozó, úgynevezett törpe-Cichlida nem. Teste hosszúkás tojásdad, oldalt mérsékelten lapított. A hátúszó hosszúra megnyúlt, a kopoltyúfedő széle fölött kezdődik. Érdekes, hogy a különböző ivarú egyedek színe egészen más, főleg nászidőben. Eleven, érdekes, kissé marakodó halak. A víz összetételére nincs semmiféle különleges igényük, de szeretik a meleget. Szinte kizárólag élőleleséget esznek, szárazeleleséget csak kivételesen fogadnak el Lebilincselő a szaporodásmódjuk. Olyan típusú ivadékgondozást végeznek, mint a nem szájköltő bölcsőszájú halak. Az ivadékokat kizárólag a nőstény gondozza. Az úgynevezett „anyai családra” ez a jellemző. A párzási előkészületekben a nőstény az aktívabb. A gondozási ösztön rendkívül fejlett, úgyhogy e halfajok — gyakrabban, mint mások — kielégítetlenül maradt ösztönük kiélésére más alanyt keresnek (pl. táplálékállatok „ivadékgondozása”). A feltűnő rajzolatáról fölismerhető nőstény (a nőstényen ívaskor általában foltmintázat jelenik meg), a költési időben nagyon támadó kedvű, s még nagyobb halak megtámadásától sem riad vissza. A tenyésztés önmagában nem nehéz, de sikere attól függ, tudunk-e egymáshoz illő párokat találni. A párképzést a különböző ivarú egyedeknek, de főként a nősténynek a marakodó természete néha kissé megnehezíti. Az ivadékok felnevelése nem nehéz, mert az elúszás első napjától kezdve hajlandók porfinomságú élőleleséget, mikrót, összenyomott Enchytraeusokat stb. fogyasztani. Kissé hőigényes, 24-28 C.

Kissé félénk, békés, kistermetű halakkal társítsuk. A vízközt lebegő eledeleket fogyasztja legszívesebben, a konkrét felszínre ritkán jár fel. Kókuszshéjből kitűnő búvóhely készíthető számára!

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: -.

Eng: Dwarf goldeneye cichlid, Golden-eyed dwarf cichlid, Goldeneye cichlid, Goldeneye dwarf cichlid, Lattice cichlid, Lattice dwarf cichlid.

Egyéb köznevei: Ti prapra, Dvargacara, Agudédé, Andia, Kääpiöakara, Cichlidé a oil d or, Cichlidé nain brillant, Acalape, Grön Bagcichlid.

KATEGÓRIÁK:

[Amerikai fajok](#), [Akváriumi halak](#), [Bölcsőszájú halak](#)

KULCSSZAVAK:

[Cichlidae](#), [Amerikai bölcsőszájúhalak](#), [Akváriumi halak](#), [1905](#), [akvarisztika](#), [Nannacara anomala](#), [Regan](#), [Színes törpesügér](#)

JELLEMZŐK:

normál (6.5-7.5 pH), átlátszó vízi, Dél-amerika, alsó szint, közepesen keményvízi 10-15°Nk, Guyanák, békés viselkedés, közepesméretű akvárium 50-100 literig, hosszú életű 6 év fölött, lágyvízi (5-10 Nk°), lassan mozgó vízi, közepesen aktív mozgású, mindenevő, keményvízi 15-20°Nk, lassú mozgású, Amerika, ragadozó, féllúgos (7.5-8 pH), közepes méretű 5-10 cm, állóvízi, félsavas (6-6.5 pH), közepes hőigényű 20-25°C, barna vízi.

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Írta: Honffy Gábor

Katalógusba került: 2008-05-14 09:01:16

Legutolsó frissítés: 2013-11-12 08:00:28

Katalógus ID: 4213

Oldal linkje: https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/bolcsoszaju_halak/amerikai-fajok/nannacara-anomala.html

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva