

Nannostomus eques - Lovacskalazac

ELSŐ LEÍRÓJA:	Steindachner, 1876
CSALÁD:	Lebiasinidae
MÉRET:	5 cm
C°:	23,0-28,0
pH°:	5.0-6.0
Nk°:	6,0-12
HELYIGÉNY:	60 liter
VISELKEDÉS:	békés, rajhal
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	összes szint
ÉLETTARTAM:	4-8 év
TERM.VÉD.:	nem értékelt



Nannostomus eques
Lovacskalazac
(Steindachner, 1876)

TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Nannostomus eques – Lovacskalazac elterjedési területe (Map)

Középső-Amazónia, Kolumbia és Guyana folyói.

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

A kicsi, nyúlánk hal testét egy ezüstös, vízszintes vonal osztja ketté. A fölötte levő terület barna, sötét kockás mintával; alatta széles, sötét sáv fut. Ez utóbbi folytatódik a farok-úszó alsó lebenyében, látszólag megnövelve a halat a többnyire ferdén felfelé irányuló, úszó és pihenő testtartás miatt. A farokúszó felső lebenye a hátúszóhoz hasonlóan szintelen. A nőstény teltebb és színei nem annyira élénkek.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Békés csapathal, a növényzet között rajokat képezve lebeg kb. 70-80 fokos szögben, a farkán állva,

TOVÁBBI KÉPEK:

Képek feltöltés alatt!

mindig a víz sodrásával szembe fordulva.

Tartása nem okoz problémákat, igénytelen, szívós halacska. Mint minden pontylazac szereti a tiszta, bomlástermékektől mentes, jól benövényesedett, de azért tágas kiúszótérrel is tartalmazó akváriumot. Mindennapi tartásához tökéletesen megfelel a csapvíz is. Amennyiben tenyésztani is kívánjuk, nagyon fontos a változatos táplálás, lehetőleg élőelelőséggel.

Mindenféle típusú élelmet elfogad, de bizonyos mérethatárokat figyelembe kell vennünk, mert szájnylása nem túl nagy. Így szóba jöhet mindenféle élő- és fagyasztott plankton, szúnyoglárva, esetleg apróra metélt tubifex és jó minőségű mesterséges poralakú vagy úszó lemezes eleség.

Tenyésztését egy kb. 3-4 literes akváriumban kísérhetjük meg, melyet igen lágy, 2-3°Nk-os, 6,8 °pH-s, 26-28°C-os vízzel 12-14 cm magasan töltünk fel. A tartály közepébe egy kis tő lándzsás vízipáfrány (*Microsorium pteropus*) bokrot tegyünk. A gyökerét egy lapos kőre vagy kavicsra erősítve horgonyozzuk le. Az így kialakított medencét hagyjuk egy pár napig állni, majd az esti órákban helyezzük át a jól kondicionált tenyészpárunkat. Rendszerint másnap délelőtt bekövetkezik az ívás, amikor is a hím a nőtényt orra segítségével a növény fonákja felé tolja, ahová nagyszemű ikráikat felragasztják. Ha egykettő lehullik, az se probléma, általában azok is már megtermékenyítettek. Ívás után a halakat fogjuk ki, és tegyünk pár csepp fertőtlenítő szert a vízbe.

Az eredmény kb. 100-150 ikraszem, mely 28-30 óra múltán kel ki, majd 1-2 nap után a lárvák sötétednek, és összesen 4-5 nap múlva úsznak el. Az ivadék azonnal felveszi szülei ferde testtartását és így keresi táplálékát. Nem könnyű megfelelő méretű indítóeleséget találni, csak nagyon apró *Cyclops* nauplius vagy *Rotatoria* jöhet számításba. De ha ezen túl vagyunk, 2-3 nap után már sórák (*Artemia*) naupliuszaival és mikroóval is etethetők. Napi kétszer etetve 6-8 hónapos korukra válnak ivaréretté.

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

Régebben a *Nannobrycon* nembe sorolták.

syn: *Poecilobrycon auratus*, *Poecilobrycon eques*.

Eng: Brown pencilfish, Diptail pencilfish, Tube-mouthed pencilfish, Tubemouth pencilfish.

Egyéb köznevei: Almindelig skrâsvømmer, Kynäkala, Schrägsteher, Spitzmaul-Ziersalmmler, Ukosnik ozdobny, Per lápiz, Pez lápiz de cola pardo, Torpedo, Jockeyfisk, Pennfisk.

KATEGÓRIÁK:

[Pontylazacok](#), [Akváriumi halak](#)

KULCSSZAVAK:

[Pontylazacok](#), [1876](#), [Lebiasinidae](#), [Akváriumi halak](#), [Lovacskalazac](#), [akvarisztika](#), [Nannostomus eques](#), [Steindachner](#)

JELLEMZŐK:

[állóvízi](#), [Kelet-Dél-Amerika](#), [közepesen keményvízi 10-15°Nk](#), [lágyvízi \(5-10 Nk°\)](#), [Amazónia](#), [közepesméretű akvárium 50-100 literig](#), [barna vízi](#), [Ecuad.-Kol.](#), [közepesen áramló vízi](#), [Dél-amerika](#), [lassan mozgó vízi](#), [Orinoco](#), [mindenevő](#), [Guyanák](#), [középső szint](#), [békés rajhal](#), [felső szint](#), [hosszú életű 6 év fölött](#), [Amerika](#), [félsavas \(6-6.5 pH\)](#), [átlagos növényzetigényű](#), [fekete vízi](#), [közepes méretű 5-10 cm](#), [hőigényes \(25-30 °C\)](#), [lassú mozgású](#), [közepes hőigényű 20-25°C](#), [savas \(6pH alatt\)](#), [sűrű növényzetigényű](#), [Andok orsz.](#), [átlátszó vízi](#), [alsó szint](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Írta: Honffy Gábor

Katalógusba került: 2008-05-12 09:01:16

Legutolsó frissítés: 2013-08-13 04:56:28

Katalógus ID: 4043

Oldal linkje: <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/pontylazacok/nannostomus-eques.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva