

Nanochromis nudiceps - Kongói tarkasügér

ELSŐ LEÍRÓJA:	Boulenger, 1899
CSALÁD:	Cichlidae
MÉRET:	7 cm
C°:	24,0-27,0
pH°:	5,0-7,0 3°S - 5°S
Nk°:	0-8,0
HELYIGÉNY:	100 liter
VISELKEDÉS:	társas
TÁPLÁLÉK:	ragadozó, mindenevő
TARTÓZKODIK?	alsó szint
ÉLETTARTAM:	5-8 év
TERM.VÉD.:	



Nanochromis nudiceps

Kongói tarkasügér

(Boulenger, 1899)

TOVÁBBI KÉPEK:



TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Melanochromis johannii -Indigósügér elterjedési területe

A Kongó folyó medencéje Közép-Afrikában.

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

A finoman árnyalt szürkésbarna hal válla kék tónusú és a hasán halvány bíborszínű terület van. A farokúszó felső részén világos és sötét vízszintes sávok alkotta mintázat látható. A nőstények sokkal színesebbek, mint a hímek, melyek hasa és úszói lilásak. A kifejlett hímeknek ezenkívül hosszabbak az anális- és hátúszóik.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Akváriumát rendezzük be bőségesen búvóhelyekkel, ezek lehetnek barlangok, sziklák, gyökerek, száraz ágak stb. A növényzet nem létkérdés, de halaink értékelni fogják, mint további fedezéket. Talajnak válasszunk homokot, mivel rendkívüli módon szeret ásni. A jó szűrés ajánlott, de még jobb, ha még tőzeget is teszünk a szűrőbe. Táplálékban nem válogatós, elfogadja a legtöbb élő és fagyasztott élelmet. Viszonylag békés, társas faj. Amennyiben biztosítjuk számára a lágy és savas vizet, jól fogja érezni magát. Társas akváriumában együtt tarthatjuk kisebb méretű pontylazacokkal, kisebb termetű bölcsőszájú halakkal. A kongói tarkasügetet legjobb párban tartani, mert időnként fajtársaival nagyon agresszíven viselkedik. Több pár tartásához nagyon nagy akvárium szükséges. Tenyésztése nem könnyű, a víz pH értékét 6,5-re, vagy még alacsonyabbra és nagyon lágyra kell beállítani, a hőmérséklet legyen 27 C° körüli.

Jellemzően barlangban, vagy erősen zárt üregben történik az ikrarakás. Ha a homoktalajon sziklákat helyezünk el a tenyészakváriumban, a hím kiássa magának az üreget alatta. Annak ellenére, hogy a hím igen hevesen udvarol, a párosodást mégis a nőtények kezdeményezik. A sikeres tenyésztés feltétele a kitűnő kondíció, és bár bölcsőszájú halak a siker nem garantált. A hím hivatásszerűen védi territóriumát, a nőtény pedig csak az ikrákat. Az ikrák kb. 2-3 nap alatt kelnek ki, a ivadék nagyjából a 7. napon úszik el. A kishalak viszonylag nagy méretűek, eleinte etethetjük őket mikroval, artemia naupliuszaival. Nagyon fontos a nagyon lágy és savas víz! Bármilyen vízváltás nagy veszteségeket okoz. Ahogy nőnek fokozatosan akklimatizálhatjuk őket normálisabb körülményekhez. Ennek a halnak a tenyésztése nem ajánlható kezdőknek a rendkívül speciális víz- és tartási igények miatt.

Nem kapható túl gyakran, de ha sikerül beszereznünk, remek kis kiegészítője lehet egy pompás kongói biotóp medencének!

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: *Nannochromis nudiceps*, *Pseudoplesiops nudiceps*.

Eng: .

Egyéb köznevei: Congo-dvargcichlide, Sinipalettikala.

KATEGÓRIÁK:

[Afrikai fajok](#), [Akváriumi halak](#), [Bölcsőszájú halak](#)

KULCSSZAVAK:

[akvarisztika](#), [Boulenger, 1899](#), [Cichlidae](#), [Afrikai bölcsőszájúhalak](#), [Kongói tarkasügér](#), [Nanochromis nudiceps](#), [Akváriumi halak](#)

JELLEMZŐK:

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Írta: Honffy Gábor

Katalógusba került: 2008-05-14 09:01:16

Legutolsó frissítés: 2013-02-02 12:16:32

Katalógus ID: 4214

Oldal linkje: https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/bolcsoszaju_halak/afrikai-fajok/nanochromis-nudiceps.html

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva