

Nematobrycon palmeri - Császárlazac

ELSŐ LEÍRÓJA:	Eigenmann, 1911
CSALÁD:	Characidae
MÉRET:	6 cm
C°:	23,0-27,0
pH°:	5.0-8.0
Nk°:	6,0-19
HELYIGÉNY:	100 liter
VISELKEDÉS:	békés
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	összes szint
ÉLETTARTAM:	4-6 év
TERM.VÉD.:	



Nematobrycon palmeri

Császárlazac

(Eigenmann, 1911)

TOVÁBBI KÉPEK:



TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Nematobrycon palmeri – Császárlazac elterjedési területe (Map)

A kolumbiai Rio San Juan környékének erdei patakjaiban fordul elő.

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

E békés természetű pontylazac mérsékelten nyúlánk testű, a hát- és hasvonal egyformán ívelt. A hím farkúszójának felső, középső és alsó sugarai meghosszabbodottak, a nőstény úszója viszont csupán beöblösödő. Zsírúszó nincs. Hosszúsága: 6 cm-ig, a nőstény valamivel rövidebb. Hátoldala zöldes-ibolyás árnyalatú halvány barnászöld. Lentebb sárgás-ezüst árnyalatú kékesfekete színű, ami sötét sáv benyomását kelti a hal oldalán. A csík a farkúszóra is átnyúlik, amelynek középső részét sötét tónusúvá teszi. Ennek a felső széle esetleg élesen elhatárolódik. A széles alapú farok alatti úszó sárga. A "sáv" fölött a hímeken egy sor vörösesbarna pikkely lehet, a nőstények halványabb színűek, ezenkívül az úszókban is van eltérés.

A szivárványhártya ragyogó kék színű.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Békés hal, legjobban növényekkel teli, sötét medencében mutat.

Tartás és tenyésztés: Ellenállóképes, egyáltalában nem kényes hal. Társas tartásra igen alkalmas. Bármely élő- és szárazzeleséget elfogad, ha az kellően kicsiny. Az ivadékok rajokat alkotnak, de a kifejlett hímek revíreket szállnak meg, s ilyenkor fajtársaikkal szemben eléggé összeférhetetlenek. Ha azonban nagyobb számban, továbbá más halak társaságában tartjuk őket, békésebbek. Ezért is fontos, hogy legalább 3 vagy 4 hím legyen, a minimum 8-10-es rajban, hogy a domináns példány ne csak egy másik hím felett éreztethesse uralmát! Kezdőknek is alkalmas pompás halak, társas medencébe is rakhatjuk őket, de a biotóp akváriumok ékkövei is egyaránt!

Videó

A tenyésztésük nem mindig könnyű. Mielőtt hozzáfognánk, bőségesen etessük őket, mert különben nem nagyon ívnak. A tenyésztőmedencébe párosával tegyük át őket. A víz lágyságát illetően nincsenek túlzott igényeik, de a legjobb eredményt 5-6°Nk-ú, 6-6,5°pH-jú, 26-28°C-s vízzel érhetjük el. A tenyésztőmedencét egy kissé sötétítsük el. Ikraaljazatként forrásmoha, finoman szabdalt levelű növények vagy perlonvatta használható. Ha a párt este betesszük, az ívás rendszerint másnap reggel megy végbe, szabadon az ikraaljazat fölött. Egy-egy pázás során egyetlen ikra kerül a külvilágba és termékenyül meg, úgyhogy az ívás órák hosszát, vagy akár egy napig is eltarthat. A szülők ikrarablók, ezért ívás után ki kell vonni őket a medencéből. Vannak olyan hímek, melyek halálra hajtják a nőtényt, ezekkel máskor ne próbálkozzunk.

Az ivadékok 24-36 óra múlva bújnak ki, majd további 4 nap múlva úsznak el, felnevelésük nem okoz különösebb nehézségeket. Gyakran tartózkodnak közvetlenül a talaj fölött. Ha megzavarják őket, azonnal el is rejtőznek benne, számuk viszonylag kicsiny: 60-80, és megfelelő táplálás esetén 1 hónap alatt eléri 1,5 cm-es nagyságot, és mintegy 6-8 hónap múltán ivarérettek lesznek.

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: *Nematobrycon amphioxus*.

Eng: Emperor tetra, Rainbow tetra.

Egyéb köznevei: Kejsertetra, Keisaritetra, Kaisersalmler, Kaisertetra, Blysczyk cesarski a. tetra cesarska, Kejsartetra.

KATEGÓRIÁK:

[Pontylazacok](#), [Akváriumi halak](#)

KULCSSZAVAK:

[Characidae](#), [Pontylazacok](#), [Császárlazac](#), [Nematobrycon palmeri](#), [Eigenmann, 1911](#), [Akváriumi halak](#), [akvarisztika](#)

JELLEMZŐK:

[felső szint](#), [Andok orsz.](#), [Amerika](#), [alsó szint](#), [átlagos élethossza 3-6 év](#), [közepes méretű 5-10 cm](#), [lágyvízi \(5-10 Nk°\)](#), [sűrű növényzetigényű](#), [közepes hőigényű 20-25°C](#), [normálméretű akvárium 100-200 literig](#), [Ecuad.-Kol.](#), [átlátszó vízi](#), [barna vízi](#), [közepesen keményvízi 10-15°Nk](#), [Dél-amerika](#), [közepesen áramló vízi](#), [féllúgos \(7.5-8 pH\)](#), [lassan mozgó vízi](#), [sárga vízi](#), [félsavas \(6-6.5 pH\)](#), [közepesen aktív mozgású](#), [hőigényes \(25-30 °C\)](#), [mindenevő](#), [békés rajhal](#), [normál \(6.5-7.5 pH\)](#), [középső szint](#), [fekete vízi](#), [savas \(6pH alatt\)](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Írta: Honffy Gábor

Katalógusba került: 2008-05-12 09:01:16

Legutolsó frissítés: 2016-10-14 11:23:38

Katalógus ID: 4009

Oldal linkje: <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/pontylazacok/nematobrycon-palmeri.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva