



Neochela dadiburjori - Kéköves pisztrángdánió

ELSŐ LEÍRÓJA:	Menon, 1952
CSALÁD:	Cyprinidae
MÉRET:	3-4 cm
C°:	23-26
pH°:	6-7
Nk°:	0-15
HELYIGÉNY:	70 liter
VISELKEDÉS:	rajhal
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	leginkább felső
ÉLETTARTAM:	~3-4 év
TERM.VÉD.:	gyakori



Neochela dadiburjori
Kéköves pisztrángdánió
 (Menon, 1952)

TOVÁBBI KÉPEK:



TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Neochela dadiburjori – Kéköves törpeponty elterjedési területe (Map)

Délkelet-Ázsia; India

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

Kicsi, felső szájállású pontyfélé. A baltahasú pontyfélékkel áll közeli rokonságban (Chela sp.), a faj a dániók legközelebbi rokona, a núriák mellett. Alapszínezete citromsárga, ami az úszók töveire is rálóg. Hasa fehéren kiviláglik, és háta esetleg halványan zöldesebb is lehet. Oldalvonala mentén egy markáns irizáló türkizkék sáv húzódik, ami nagyon attraktívá teszi.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Könnyen tartható, kezdőknek is kiválóan alkalmas kis halacska. Mindenképpen 6-8 egyedet gondozunk, mert szigorúan rajhal. Nyílt víztér szükségeltetik neki az úszáshoz, a vízfelszín közelében mozog. Alsóbb régiókban dúsan növényesíthetünk, és a háttér mentén például egy Vallisneria-sort is ültethetünk. Az oxigéndús, jól áramló és mozgó, kristálytisza vizet kedveli, de átlagos szűréssel is megelégszik, ha a vizének 15-20%-át rendszeresen kicseréljük. Nem kell megijedni, nem nehéz egyáltalán gondozása, nem adja fel olyan könnyedén. Társításánál ügyeljünk arra, hogy ne kerüljenek mellé olyan fajok, melyek jóval nagyobbak nála, kárt tehetnek benne vagy méretükkel egyáltalán csak félelemben tartásuk. Kisebb díszmárnák, dániók, razbórák, törpegurámik és párducscsíkok kiváló biotóp társai, de akár törpe kalászhallakkal is egybekerülhet. Ha nem biotópban tartjuk, akkor leginkább pontylazacok, kisebb testű harcsák felelnek meg mellé. Etetése sem problémás semmilyen szinten, mivel elfogadja a jó minőségű száraz eledeleket, bár kondíciójának és szépségének megtartásához szükségeltetik néha fagyasztott és élő eleségek etetése egyaránt, amiket nagy örömmel fogad.

Tenyésztéséhez egy kisebb akváriumot készítsünk elő, amibe lágy és enyhén savas vizet töltünk, esetleg égetobozzal kezelhetjük. Csoportosan is kitehetjük, sőt, akár egy kis akváriumban csak őket tartva nem is kell a kifejlett egyedeket külön venni mindig. Ha jó a helyük és kondíciójuk, akkor gyakran ikráznak, egy nagy csapattól jóformán folyamatosan lehetnek ikráink. A petéket vízfelszín közeli növénylevelekre helyezik, de ikráztató csomókat is alkalmazhatunk. Ívató medencéből a szülőket kell mihamarabb kivenni, saját akváriumukból pedig az ikrákat, mivel egyből rabolhatnak rájuk. A kishalak kb. 3 nap múlva kikelnek, és további 4-5 nap múltán elúsznak. Etetésük papucsállatkával és egyéb mikroszkopikus élőlényekkel oldható meg az első héten, csak utána fogadják el a frissen kelt Artemiát. A rendszeres frissítő vízcserekről ne feledkezzünk meg a jó vízminőség érdekében, de bőséges etetés és tágas hely mellett sem túl gyors a növekedésük.

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: *Chela dadiburjori*, *Chela dadidurjori*, *Chela dadyburjori*, *Chela dadydurjori*, *Laubuca dadidurjori*, *Laubuca dadyburjori*.

Eng: Dadio.

Egyéb köznevei: Kýlnatka tamilská, Kýlnatka trpasličí, Hehkukölibarbi, Dadyburjors Kielbauchbärbling.

KATEGÓRIÁK:

[Pontyfélék](#), [Akváriumi halak](#)

KULCSSZAVAK:

[Cyprinidae](#), [Pontyfélék](#), [1952](#), [Kéköves törpeponty](#), [Menon](#), [Akváriumi halak](#), [Neochela dadiburjori](#), [akvarisztika](#)

JELLEMZŐK:

[félsavas \(6-6.5 pH\)](#), [átlátszó vízi](#), [nagyon aktív mozgású](#), [hőigényes \(25-30 °C\)](#), [közepesen áramló vízi](#),

[gyors vízáramlású](#), [igenlágynyvízi \(0-5°Nk\)](#), [közepesen aktív mozgású](#), [békés rajhal](#), [lágynyvízi \(5-10 Nk°\)](#), [mindenevő](#), [közepes hőigényű \(20-25°C\)](#), [felső szint](#), [közepesen keményvízi \(10-15°Nk\)](#), [átlagos élethossza 3-6 év](#), [India](#), [közepesméretű akvárium \(50-100 literig\)](#), [átlagos növényzetigényű](#), [sűrű növényzetigényű](#), [nagy méretű 10-20 cm](#), [Ázsia](#), [Dél-Ázsia](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Írta: Liziczai Márk

Katalógusba került: 2012-09-23 09:01:17

Legutolsó frissítés: 2018-09-15 22:05:53

Katalógus ID: 4465

Oldal linkje: <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/pontyfelek/neochela-dadiburjori.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva