

## Nimbochromis polystigma - Sokfoltos sügér

ELSŐ LEÍRÓJA:	Regan, 1922
CSALÁD:	Cichlidae
MÉRET:	25 cm
C°:	23,0-25,0
pH°:	7,5-7,8 (8°S - 15°S)
Nk°:	10,0-18 mélység: 0-35(76)m
HELYIGÉNY:	550-600 liter
VISELKEDÉS:	ragadozó, területvédő
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	középső- és alsó szint
ÉLETTARTAM:	5-8 év
TERM.VÉD.:	



**Nimbochromis polystigma**

*Sokfoltos sügér*

(Regan, 1922)

### TOVÁBBI KÉPEK:



### TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Térkép még nem készült az adatlaphoz, feltöltése folyamatban!

A Malawi-tó sziklás part menti vizei.

### KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

Régi kedvenc a hasadékvölgyi halak között, elsőként ez a faj szaporodott közülük fogságban. Halvány alapszínét nagy barna foltok fedik és vörösesbarna pettyek tarkítják. A jó megtartású hímek színe általában élénkebb.

### TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Gyors úszó, szüksége van sok helyre. A halakkal táplálkozó fajokra jellemzően rajtaütéses módszerrel vadászik. E fajt nyugodtan sorolhatjuk a leginkább falánk halevő fajokhoz. A halak mellett elfogad jó

minőségű pelletet (és néha pelyhet - de nem jellemző), amely mellett adhatunk még fagyasztott élelmet is, hogy jó formában maradjon. Rendszeresen kaphat még garnélarákot melyet vágjunk nagyon apró darabokra, így más bölcsőszájú halakkal együtt tartva is jut mindenkinek. Ellenkező esetben a *Nimbochromis* fajok hatalmas szájuk miatt mindent felzabálnak a többiek elől. Az evés módszeres: szájukba vesznek egy adagot, majd akkurátusan megrágják. A hímek nagyon agresszívek, folyamatosan több, mint egy hím egy tartályban erősen kerülendő, kivéve, ha igazán nagy tartály áll rendelkezésünkre (több mint 1000 liter). A hímek szinte egész hónapban békésen elvannak, de mikor elérkezik a szaporodási időszak még a 2,8 méteres akvárium is kevésnek bizonyul. Bár nőstényei nagyon hasonlítanak *N. livingstoni* nőstényeihez, a hímek mégis gond nélkül kiválasztják a megfelelő partnert, tehát nincs fajkeveredés.

Tenyésztésük könnyű, csak bőséges tér szükséges hozzá, és ha ez megvan, rengeteg ikrát raknak. Az ikrázást jellegzetes szájköltő viselkedés követi. Sajnos az ivadékok közül nem mind marad életben, súlyos veszteségeket okoz az, hogy az összes *Nimbochromis* faj egyenlőtlenül nő és a kannibalizmus is nagyon gyakori, ezért bölcs dolog külön válogatni a kisebb ivadékokat a nagyobbaktól (kb. 1 hónap elmúltával), így növelhető a túlélési arány. Hatalmas mennyiségű homok megmozgatásával készíti elő az ívást. A nőstények többször is megtekintik az elkészült művet, de amíg nem tetszik, nem hajlandóak ívni. A nőstényeket egész nap üldözik, ezért a jó hangulat érdekében célszerű néhány búvóhelyet felállítani, pláne ha több nőstény is van a tartályban. A hímek ádázul védik territóriumukat. Minimum akváriumhossz: 200 cm / 750 liter. Ha egynél több hímeket tartunk, akkor 250 cm / 1000 liter a minimális méret.

Csak nagytestű, robusztus és erős sügérekkel társítsuk!

## EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

**syn:** *Haplochromis polystigma*, *Cyrtocara polystigma*, *Haplochromis maculimanus*.

**Eng:** Hyena Cichlid.

**Egyéb köznevei:** Leopardcichlide, Polystigma, Täpläsuuhautoja, Vielfleckmaulbrüter, Mbuna, Gebacz wieloplamy.

## KATEGÓRIÁK:

[Afrikai fajok](#), [Akváriumi halak](#), [Bölcsőszájú halak](#)

## KULCSSZAVAK:

[Nimbochromis polystigma](#), [Sokfoltos sügér](#), [Akváriumi halak](#), [akvarisztika](#), [Regan](#), [Cichlidae](#), [Afrikai sügérek](#), [1922](#)

## JELLEMZŐK:

## FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

**Írta:** Honffy Gábor

**Katalógusba került:** 2008-05-14 09:01:16

**Legutolsó frissítés:** 2017-02-01 13:50:35

**Katalógus ID:** 4217

**Oldal linkje:** [https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/bolcsoszaju\\_halak/afrikai-fajok/nimbochromis-polystigma.html](https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/bolcsoszaju_halak/afrikai-fajok/nimbochromis-polystigma.html)

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva