

## Oreichthys parvus - Foltosúszójú üvegmárna

ELSŐ LEÍRÓJA:	Hamilton, 1822
CSALÁD:	Cyprinidae
MÉRET:	5 cm
C°:	23-26
pH°:	6-7
Nk°:	3-15
HELYIGÉNY:	75 liter
VISELKEDÉS:	békés
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	középső általában
ÉLETTARTAM:	5-8 év
TERM.VÉD.:	adathiányos



**Oreichthys parvus**  
*Foltosúszójú üvegmárna*  
 (Hamilton, 1822)

### TOVÁBBI KÉPEK:

### TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Oreichthys parvus – Foltosúszójú üvegmárna elterjedési területe (Map)



Thaiföldi folyóvizek.

### KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

Hátoldala krémsárga, testoldala alul ezüstössé válik. Oldalán homályos vonal fut végig, melyet a pikkelyek sötét sávjai alkotnak. A hátúszó csúcán feltűnő fekete folt van. Feje csúcsos, szeme feltűnően nagy. A nőstény tömörsibb és fakóbb.

### TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Ritkán importált faj, nagyon nehéz hozzájutni. Rajhal, mindenképpen csoportban tartsuk, ami mindenképpen legalább 6 egyedet jelentsen. Békés természetű, kiválóan alkalmas gurámik és razbórák

mellé egy biotóp medencébe, nagyon aktív vagy nagytestű társaságot ne társítsunk vele. Nem biotopikusan leginkább lazacok lehetnek társai. Kedveli a sűrű növényzetet! Félénk faj, ezért is fontos, hogy meglegyen a megfelelően sűrű növényzet, ahol búvóhelyet lel magának. Lehetőleg sötét talajt töltsünk a medence aljára, ami biztonságérzetét növeli, valamint tompított fénnel világítsunk. E célból úszónövényzetet is használhatunk.

A vízcserétet ne hanyagoljuk, érzékeny a felgyülemlett károsanyag tartalomra. Lehetőleg lágy és enyhén savas vizet alkalmazzunk, amit tőzeggel vagy égertobozzal is kezeljünk, hogyha azt szeretnénk, hogy halaink meglehetősen jól érezzék magukat.

Etetésére jó minőségű száraz tápok is használhatóak, de kapjon élő és fagyasztott kiegészítést is (pl. grindál, szúnyoglárva).

Tenyészmedencéjükbe helyezzünk valamilyen nagy levelű növényt, például Anubiast vagy Echinodorust, aminek a fonákjára fogják ikrákat ragasztani. A jól táplált szülőket tőzeggel kezelt lágy és enyhén savas vizű medencébe kell kihelyezni. Az ikrázástól számítva az első ivadék kikeléséig is akár bent maradhatnak a szülők, de keléskor már vegyük ki őket. A kis ivadékok mikroszkópikus eledellel indíthatóak, a 3 napos kelési és 5 napos elúszási idő leteltével. Kb. 8 nap után (mialatt például papucsállatkával etettünk) megpróbálkozhatunk frissen kelt artémiát is adni nekik.

Van egy ismertebb rokon faja, a pompás törpemárna (*Oreichthys cosuatis*), amire hasonlít, valamint az *O. crenuchoides* is hasonló rokon faj.

## EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

**syn.:** *Barbus roloffi*, *Puntius roloffi*

**Eng.:** Drapefin barb

**Egyéb:** Kosuati malý, Pikkupurjebarbi

## KATEGÓRIÁK:

[Pontyfélék](#), [Akváriumi halak](#)

## KULCSSZAVAK:

[Cyprinidae](#), [Pontyfélék](#), [1822](#), [Akváriumi halak](#), [akvarisztika](#), [Foltosúszójú üvegmárna](#), [Hamilton](#), [Oreichthys parvus](#)

## JELLEMZŐK:

[Thaiföld](#), [hőigényes \(25-30 °C\)](#), [lassan mozgó vízi](#), [békés rajhal](#), [normál \(6.5-7.5 pH\)](#), [közepesen aktív mozgású](#), [igenlágyvízi \(0-5°Nk\)](#), [mindenevő](#), [hosszú életű 6 év fölött](#), [lágyvízi \(5-10 Nk°\)](#), [középső szint](#), [átlagos élethossza 3-6 év](#), [sűrű növényzetigényű](#), [fekete vízi](#), [nagyméretű 10-20 cm](#), [közepes hőigényű](#)

[20-25°C](#), [barna vízi](#), [közepesen keményvízi 10-15°Nk](#), [Ázsia](#), [közepesméretű akvárium 50-100 literig](#), [Dél-Ázsia](#), [fésavas \(6-6.5 pH\)](#), [közepesen áramló vízi](#).

## FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

**Írta:** Honffy Gábor

**Katalógusba került:** 2009-06-05 09:01:15

**Legutolsó frissítés:** 2014-06-29 11:02:33

**Katalógus ID:** 3922

**Oldal linkje:** <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/pontyfelek/oreichthys-parvus.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva