

Osteochilus vittatus - Hasselt-Márna

ELSŐ LEÍRÓJA:	Valenciennes, 1842
CSALÁD:	Cyprinidae
MÉRET:	30 cm
C°:	22-25
pH°:	6,5-7
Nk°:	4-12
HELYIGÉNY:	650 liter
VISELKEDÉS:	békés
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	összes szint
ÉLETTARTAM:	8-12 év
TERM.VÉD.:	gyakori



Osteochilus vittatus

Hasselt-Márna

(Valenciennes, 1842)

TOVÁBBI KÉPEK:

TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Osteochilus vittatus – Hasselt-Márna elterjedési területe (Map)



Indonézia, Malajzia, Thaiföld é a Szunda-szigetek folyói, patakjai.

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

A fiatal példányok pikkelyeik vörösésbarna pontmintázata miatt csíkosnak tűnnek. A faroknyélen sötét folt van. Az idős halak egyszínű szürkészöldek. Felső ajkát kiütésszerű kinövések rojtozzák, az alsó ajak pedig „algakaparóvá” módosult. Úszói sárgásvörös színűek.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Nagyon mutatós fiatal korában, de mint a fekete rojtosszájú hal, gyorsan nagyra nő és sok helyet igényel.

Bemutató akváriumokba való, nagy akváriumokba, ahol erős szűrés biztosított! Sokat piszkít, a nagy medence megtisztítására erős szűrő kell mindenképpen, ami áramlást is képes biztosítani, mivel szeret fickándozni. Nagyon mozgásigényes, a megfelelő kiúszótér szintén fontos számukra! A dekorációkkal is vigyázzunk, hogy ne lógjanak több helyen nyílt térbe, ahol a halak nekiiramodhatnak, és így megsérthetnék magukat. A finom levelű növényeket megcsipkedheti, ezekkel óvatosan bánjunk, szegélynövények szerencsésebbek.

Csapatban szeret élni, célszerű 5 példányt minimum együtttartani egy nagy medencében. Könnyen kiugorhat, ugrálós, a fedőüveg legyen elég erős, amit nem tud eltörni. Mohón táplálkozik, adhatunk neki sok, különféle eleséget is! A száraz eledelket épp úgy fogyasztja, mint a forrázott zöldségeket, szúnyoglárvát. Vitalitása megőrzéséhez fontos szerep jut a változatos táplálkozásnak is! A rendszeres vízcseréket ne hanyagoljuk!


Társítani nagytermetű, hasonló kaliberű halakkal lehet, más márnák, nagytestű gurámik, csíkfélék, harcsák optimálisak.

Nem tenyésztik akváriumokban.

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn.: *Osteochilus hasseltii*, *Rohita hasseltii*, *Labeo neilli*, *Osteochilus duostigma*, *Osteochilus neilli*, *Osteochilus kuhlii*, *Rohita rostellatus*, *Rohita erythrura*, *Rohita kuhlii*, *Osteochilus melanopterus*.

Eng.: Hard-lipped barb, Silver sharkminnow, Nile carp, Bonylip barb

Egyéb köznevei: , *Carp*, *Terbui*, *Bulan-bulan*, *Keperas*, *asah-asah*, *Hundalap*, *Nillem*, *Pora-pora*, *Uen kei ue*, *Parmička Hasseltova*, *Tvrđoretka Hasseltova*, *Tvrđoretka bantamská*, *Javakarpe*, *Javakarpfen*, *Nilem*, *Mellem*, *Molem*, *Monto*, *Muntu*, *Wader*, *Kros*, *Trey krom*, *Trey rolok sar*, *I Thai*, *Pa khi ka pheuay*, *Pa khao mong*, *Pba kee ga peu*, *Kajong*, *Putih*, *Sisek*, *Tebal*, *Terbol*, *Terbui*, , *Остухил Хассельта*, *Barbo-boca-de-osso*, *Javakarp*, *Pla i gun tu bo*, *Pla khi khom*, *Pla prom hua men*, *Pla sa*, *Pla soi nok khao*, *Cá lúi soc*, *Cá mé lúi* .

KATEGÓRIÁK:

[Pontyfélék](#), [Akváriumi halak](#)

KULCSSZAVAK:

[1842](#), [Akváriumi halak](#), [Pontyfélék](#), [akvarisztika](#), [Cyprinidae](#), [Hasselt-Márna](#), [Valenciennes](#), [Osteochilus vittatus](#)

JELLEMZŐK:

[nagy \(több 200 liternél\)](#), [középső szint](#), [nagyon aktív mozgású](#), [normál \(6.5-7.5 pH\)](#), [felső szint](#), [gyors vízáramlású](#), [alsó szint](#), [átlagos növényzetigényű](#), [békés rajhal](#), [igenlágvyvízi \(0-5°Nk\)](#), [hosszú életű 6 év](#)

fölött, lágyvízi (5-10 Nk°), barna vízi, Ázsia, gyér növényzetigényű, közepes hőigényű 20-25°C, Dél-Ázsia, óriás méretű 20 cm fölött, közepesen keményvízi 10-15°Nk, Indonézia, közepesen áramló vízi, Thaiföld, közepesen aktív mozgású, mindenevő, sárga vízi.

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Írta: Honffy Gábor

Katalógusba került: 2009-06-05 09:01:15

Legutolsó frissítés: 2014-06-29 11:09:17

Katalógus ID: 3963

Oldal linkje: <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/pontyfelek/osteochilus-vittatus.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva