

Pangio cuneovirgata - Jaguárcsík

ELSŐ LEÍRÓJA:	Raut, 1957
CSALÁD:	Cobitidae
MÉRET:	5-6 cm
C°:	24-28
pH°:	4-7,5
Nk°:	0-15
HELYIGÉNY:	40 liter
VISELKEDÉS:	társas
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	talajlakó
ÉLETTARTAM:	4-6 év
TERM.VÉD.:	kevésbé veszélyeztetett



Pangio cuneovirgata
Jaguárcsík
(Raut, 1957)

TOVÁBBI KÉPEK:



TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Térkép még nem készült az adatlaphoz, feltöltése folyamatban!

Délkelet-Ázsia; Malajzia

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

Hosszú, hengeres csíkféle, bajuszszálakkal szája körül. Hasa fehér, testfeléig nyúló háti mintázata van, ami barna és élénk citromsárga csíkok váltakozását jelenti. Mutatófaj. Nagyon hasonlít a Pangio malayana-ra, tőle az különbözteti meg, hogy a jaguárcsíknak a szemén átmenő csík egészen a fej alsó feléig leér.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Tartása igazándiból nem problémás, nem kell hozzá nagyon nagy gyakorlat. Csapatosan tartjuk, 6-8

példányban. Éjszaka mozog leginkább, de napközben is előjön. Szívesen beássza magát a talajba, ezért az legyen apró szemcsézettségű. Búvóhelyek gyanánt ágakat, köveket és növényeket helyezünk medencéjébe. Érzékeli az időjárás-változást más csíkfélékhez hasonlóan, ilyenkor aktívan mozog és levegőt nyel, amit bélfalán képes megkötni, így oxigénszegény vízben is elvan. Tebang-leveleket helyezhetünk medencéjébe, így az eredeti élőhelyét utánozván. Társítása problémamentes, mivel nem ragadozik, törperazbórákkal is nyugodtan egyberakható.

Sötétedés után táplálkozik leginkább, ezért állagát sokáig megőrző tablettákat, pelleteket kapjon, és ügyeljünk, hogy ezeket társhalai ne fogyasszák el előle! Kedveli továbbá a fagyasztott és élő táplálékokat is.

Akváriumban nem tenyésztik, elvéve előfordulhat spontán szaporodás, különböző környezeti változások együttes hatására (hidegvizes-vízcsere, légnyomás-változás, több élő eleség, stb.).

Sajnos csak ritkán kapható faj különösen mutatós kinézete ellenére, gyakran csak véletlenül keveredik importszállítmányokba, kimondottan ezt a fajt nem igazán hozzák Magyarországra.

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: *Acanthophtalmus cuneovirgatus*.

Eng: Indian Thorneye.

Egyéb köznevei: Sekavec johorský, Satulapiikkisilmä, Täpläpiikkisilmä.

KATEGÓRIÁK:

[Akváriumi halak](#), [Csíkfélék](#)

KULCSSZAVAK:

[1957](#), [Cobitidae](#), [Csíkfélék](#), [Jaguárcsík](#), [Pangio cuneovirgata](#), [Raut](#), [Akváriumi halak](#), [akvarisztika](#)

JELLEMZŐK:

[félsavas \(6-6.5 pH\)](#), [Indokína](#), [Nagy-Szunda-szék](#), [bújós](#), [Borneó](#), [hőigényes \(25-30 °C\)](#), [savas \(6pH alatt\)](#), [alsó szint](#), [békés viselkedés](#), [igenlágvízi \(0-5°Nk\)](#), [lágvízi \(5-10 Nk°\)](#), [közepes hőigényű \(20-25°C\)](#), [közepesen keményvízi \(10-15°Nk\)](#), [kisméretű akvárium \(50 literig\)](#), [sárga vízi](#), [közepes méretű 5-10 cm](#), [átlátszó vízi](#), [közepesen áramló vízi](#), [lassan mozgó vízi](#), [mindenevő](#), [átlagos élethossza 3-6 év](#), [átlagos növényzetigényű](#), [lassú mozgású](#), [sűrű növényzetigényű](#), [állóvízi](#), [barna vízi](#), [Ázsia](#), [Dél-Ázsia](#), [Indonézia](#), [Thaiföld](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

<http://www.fishbase.se/summary/Pangio-cuneovirgata.html>

Írta: Liziczai Márk

Katalógusba került: 2012-07-08 09:01:17

Legutolsó frissítés: 2018-04-23 09:27:49

Katalógus ID: 4389

Oldal linkje: <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/csikfelek/pangio-cuneovirgata.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva