

Pangio kuhlii - Jávai párduccsík

ELSŐ LEÍRÓJA:	Valenciennes, 1846
CSALÁD:	Cobitidae
MÉRET:	9-12 cm
C°:	24-30
pH°:	5,5-6,5
Nk°:	1,0-13
HELYIGÉNY:	75 liter
VISELKEDÉS:	békés
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	alsó szint
ÉLETTARTAM:	3-17 év
TERM.VÉD.:	nem értékel



Pangio kuhlii
Jávai párduccsík
(Valenciennes, 1846)

TOVÁBBI KÉPEK:



TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Pangio kuhlii – Jávai párduccsík elterjedési területe (Map)

Kizárólag Jáva szigetén fordul elő.

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

A féregszerű hal színe aranybarna, hasoldala rózsaszínes árnyalatú. Az apró szem eltűnik az egyik keresztsávbán, melyek többségét keskeny sárga vonal szakítja meg. Bizonyos fényviszonyok között a gerincoszlop és a belső szervek láthatóvá válnak.

A fej kicsiny, kerek, a száj alsóállású, három pár bajuszszál övezi. A kopolytúrás igen rövid. A hím hosszúsága 10, a nőstényé 12 cm-t ér el.

Világos okkersárgás rózsaszínű alapon 15—20 szabályos, barnásfekete harántsáv van, amelyek a hasig

érnek, azt azonban szabadon hagyják.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Akváriumi állományai gyakorlatilag ismeretlenek, szinte sosem kerül forgalomba. A kereskedésekben beszerezhető párduccsíkot (*Pangio semicincta*) gyakran tévesen *P. kuhlii* néven azonosítják.

A Csíkfélék (*Cobitidae*) családjának egyik neme; számos faja és alfaja Délkelet-Ázsiában széltében megtalálható. A kicsiny, hosszúkas halak teste féregszerű, aprópikkelyek borítják. Kicsiny szemüket üvegesen átlátszó bőr fedi, amely a fenéklakó halak számára védelmet biztosít az esetleges sérülések ellen. A szemek alatt egy-egy fölállítható tüske van. A csíkfélék szeretik a tiszta, átlátszó, nem túlságosan friss vizet, a lágy, korhadékréteges fenéktalajt, amelyet az akváriumban leginkább kifőzött tőzegrostokkal utánozhatunk. Szeretik meg az elrejtőzési lehetőségeket. Az éles szemcséjű homok nem megfelelő, mert az állatok szívesen beássák magukat a fenéktalajba, s eközben megsérülhetnek. Az ázalékállatokban (infuzóriumokban) gazdag vizet és a vízvirágzást nem tűrik. A fényt kerülő állatok többnyire csak alkonyat felé kezdenek mozgolódni, amikor is kigyózó mozdulatokkal úszkálnak az üvegtáblák mentén ide-oda.

Ha megszokták az akváriumot, nappal és villanyfénynél is megfigyelhetők, amint táplálékot keresve a fenék mentén kigyóznak. Társas akváriumokba nagyon alkalmasak, mert a talajzóna élénkítéséhez nagyban hozzájárulnak. Növények közé is szívesen bújnak, ahol harántcsíkos mintázatuk jól rejti őket.

Táplálékuk a talajban élő apró állatok, rovarlárvák és férgek, állati és növényi hulladékok, valamint az akváriumban a fenékre süllyedt szárazzeleség (pl. eleségtabletták is!). A társas akváriumban arra kell ügyelni, hogy az eleség egy része lejusson a talajra, s így a csíkfélék is kivehessék belőle a részüket. Majdnem minden importtételben találtak olyan állatok is, amelyek egyszínű világosak vagy sötétek. Az egyes fajokon és alfajokon belül a színezet rendkívül változékony. Egyes esetekben kétségbe vonjak, indokolt-e fajokról beszélni. Az ellenérvek ugyan nem mindig helytállóak, mégis lehetséges, hogy egyes fajok csak ugyanannak a fajnak az alfajai, s csupán a nagy élettér következtében alakultak ki bizonyos területeken állandó színek.

Íváskor ív alakban kigyózva szorosan egymáshoz simulnak, s egyre gyorsabban forognak egymás körül. Közben vörösesfehér petéket raknak le. A hőmérséklet 24—30 °C.

Lindquist megfigyelése szerint a csíkfélék habfészket építenek. Közlését fenntartással kell fogadni, mert a habfészkek aktív építése az eddigi megfigyelések szerint nem tartozik a csíkfélék és hasonló halak szokásai közé. Feltehető, hogy az állatok párzása közben, az erőteljes mozgás által keltett buborékképződést tapasztalt.

A. Wilhelm arról számol be, hogy az *A. kuhlii* sikertelenül tenyésztette. Eszerint a pár egy nagy akváriumban *Symnema triflorum* és *Myriophyllum* növények igen magas és nagyon sűrű állománya fölött ivott. A párzó állatok élénken csapkodtak a víz felszínén. (Megjegyzem, hogy közben persze nagyon könnyen előfordulhat habképződés, különösen, ha a víznek felületi hártyája van.) Minden egyes alkalommal 20—30 zöldes színű petét raktak. Valamivel később egy hím két nőténnyel ivott. A leszedetetett és külön edénybe tett peték rögtön odaragadtak az edény fenekéhez. A kibúvó ivadékok száma csekély, mindössze

18 volt: a peték jó része elgombásodott. A fölnevelés két öntöttüvegű tartályban történt, amelyeket nagyobb akváriumban felfüggesztettek. A fenéken homok- és tőzegréteg, néhány növény szár, pár darab kavics előnyösnek bizonyult. A víz hőmérséklete 26 °C; az összetételére vonatkozóan már nem állnak rendelkezésre adatok.

Az ivadékokat először öt napon át infuzórium-készítménnyel, majd újabb öt napig porfinomságú műeleséggel etették. A vizet az edényekben kétnaponként részben kicserélték (szűrőn keresztül pótolták). Az ivadék az ötödik napon 6 mm, a tizedik napon 10 mm, három héttel később 12—15 mm hosszúságot ért el, és tipikus alakja is ki fejlődött. Wilhelm közléseit W. Goebel megerősítette. Az általa megfigyelt párzásmenet tökéletesen megfelel más csíkfélékének. A párzást a szorosan egymáshoz simuló párnak a vízfelszínre való kigyózó úszása vezette be, ahol az állatok alaposan csapkodva forogtak egymás körül. A világossárga peték lesüllyedtek a fenékre. Goebelnek sikerült ezek közül néhányat kikeltetni, s 11 csíkivadékokat nevelt föl. Az apró és átlátszó állatkák először infuzórium-készítményt kaptak. 12 nap alatt elérték a 7 mm hosszúságot. Goebel is megfigyelte a buborékképződést a víz felszínén, de ez valószínűleg inkább a párzás egyik mellék-jelensége volt.

Érdekes, hogy a párzás megindulásához alighanem szükség van a társak testi érintésére, mert minden valószínűség szerint alig látnak, de más módon sem képesek megérezni egymás jelenlétét. Az ivari különbségek minden *Acanthophthalmus* fajon elsősorban abban mutatkoznak, hogy a hím karcsúbb, a nőstény viszont teltebb (különösen felülről nézve), és valamivel nagyobb is szokott lenni.

H. Frey

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: *Acanthophthalmus fasciatus*, *Acanthophthalmus kuhlii sumatranus*, *Cobitis kuhlii*, *Pangio fasciatus*.

Eng: Coolie loach, Giant coolie loach, Leopard loach, Slimy loach, Slimy myersi.

Egyéb köznevei: Sekavec páskovaný, Almindelig kuhlial, Kuhli loach, Piikkisilmä, Albino-Dornauge, Dornauge, Geflecktes Dornauge, Halbgebändertes Dornauge, Vietnam-Dornauge, Piskorek pólpregowany, Kulial.

KATEGÓRIÁK:

[Akváriumi halak](#), [Csíkfélék](#)

KULCSSZAVAK:

[Cobitidae](#), [Csíkfélék](#), [Jávai párduccsík](#), [Pangio kuhlii](#), [1846](#), [Valenciennes](#), [Akváriumi halak](#), [akvarisztika](#)

JELLEMZŐK:

[barna vízi](#), [közepesméretű akvárium 50-100 literig](#), [Ázsia](#), [közepesen áramló vízi](#), [Dél-Ázsia](#), [lassan mozgó vízi](#), [Indonézia](#), [mindenevő](#), [félsavas \(6-6.5 pH\)](#), [átlagos élethossza 3-6 év](#), [hőigényes \(25-30 °C\)](#),

[átlagos növényzetigényű](#), [sárga vízi](#), [savas \(6pH alatt\)](#), [lassú mozgású](#), [hosszú életű 6 év fölött](#), [közepes méretű 5-10 cm](#), [alsó szint](#), [sűrű növényzetigényű](#), [fekete vízi](#), [közepes hőigényű 20-25°C](#), [békés viselkedés](#), [nagy méretű 10-20 cm](#), [bújós](#), [átlátszó vízi](#), [igenlágyművi \(0-5°Nk\)](#), [állóművi](#), [Jáva](#), [közepesen keményvízi 10-15°Nk](#), [lágyművi \(5-10 Nk°\)](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Írta: Honffy Gábor

Katalógusba került: 2008-05-07 09:01:17

Legutolsó frissítés: 2017-02-01 21:29:09

Katalógus ID: 4267

Oldal linkje: <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/csikfelek/pangio-kuhlii.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva