


Papucsállatka

Paramecium caudatum - Papucsállatka




Az éppen kikelt, illetve, elúszott halivadék legapróbb élőléységét alkotó egysejtű ázalékállatok (Infusoria) közül legérdemesebb a papucsállatkát (*Paramecium caudatum*) tenyésztani.

Kisméretű ivadékok indító tápláléka

A poshadó vizekben igen gyakori 0,12-0,35 mm hosszú, mikroszkopikus élőlények tiszta tenyészetének nagy előnye — a régebbi, bizonytalan összetételű ún. "infuzórium-tenyészetekkel" szemben —, hogy a halivadék már életének első napjaiban szívesen fogyasztja, könnyen tenyészthető és nagyobb tömegben is teljesen veszélytelen a zsenge ivadéokra, amit nem mindegyik ázalékállatról mondhatunk el.

Tenyésztés



Paramecium caudatum Papucsállatka

Paramecium-tenyészet céljára 2-3 literes befőttesüveget használjunk. Ezt félig vagy 2/3 részéig töltsük meg vízzel. A tenyészet tápközegéül 1-2 cm-es, kockákra vágott és napon vagy fűtőttest közelében jól kiszárított banánhéjat, karalábét vagy repcét szórjunk a vízbe (üvegenként 2-3 kockányit számítva). Ezután beoltjuk a tenyészetet valamelyik akvaristatársunk tenyészetéből származó papucsállatkákkal. Ha erre nincs lehetőségünk, akkor szűrjük át mocsaras víz iszaprétegének közeléből vagy bármely régebbi pocsoljából származó vizet a legsűrűbb selyemszitaanyagon, s a szűrletben mindig megtaláljuk a *Paramecium*okat. Felismerésükre és tenyészetünk tisztaságának rendszeres ellenőrzésére igen jó szolgálatot tesz egy 8-10 szeres nagyító lupé, vagy még inkább egy 40-60-szoros nagyítású zsebmikroszkóp. A tenyészetet világos, napos helyre állítsuk. Ha a tenyészet termelékenysége egy idő múlva csökken, akkor újból dobjunk be néhány darabka szárított banánhéjat, karalábét, repcét vagy karórépát, s egyidejűleg a tenyészet vizét is cseréljük ki. A már jól működő tenyészethez a szárított karalábédarabkák helyett egy-egy kávéskanálnyi tejet is önthetünk, ami azzal az előnnyel is jár, hogy megszünteti a tenyészet kellemetlen szagát. Egyszerre csak kevés tejet öntsünk a tenyészetbe, mert az el nem fogyasztott tej megsavanyítja a vizet. Újabb tejadagot csak akkor adjunk, ha a víz már teljesen kitisztult.



Paramecium caudatum - Papucsállatka

KATEGÓRIÁK:

[Akvarista Lexikon](#), [Díszhalak etetése](#)

KULCSSZAVAK:

[etetés](#), [caudatum](#), [ivadékeleség](#), [papucsállatka](#),
[paramecium](#), [tenyésztés](#), [díszhaleleség](#)

Beküldte: gabrinus

Katalógusba került: 2011-08-28 09:48:00

Legutolsó frissítés: 2017-08-04 06:23:52

Katalógus ID: 6715

Oldal linkje:

<https://akvaristalexikon.hu/akvarista-lexikon/papucsallatka.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva