

Paracanthocobitis rubidipinnis - Bíborfarkú kövicsík

ELSŐ LEÍRÓJA:	Blyth, 1860
CSALÁD:	Nemacheilidae
MÉRET:	7-8 cm
C°:	22-26
pH°:	7
Nk°:	0-15
HELYIGÉNY:	80 liter
VISELKEDÉS:	társas
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	talajlakó
ÉLETTARTAM:	kb.6 év
TERM.VÉD.:	kevésbé veszélyeztetett



Paracanthocobitis rubidipinnis

Bíborfarkú kövicsík

(Blyth, 1860)

TOVÁBBI KÉPEK:

Képek feltöltés alatt!

TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Térkép még nem készült az adatlaphoz, feltöltése folyamatban!

DK-Ázsia; India, Bangladesh, Burma

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

Tömzsi, hengeres testalkatú csíkféle. A szürke és a barna mintákban váltakozik márványos tarkítottágban színezete. Úszói enyhén pirosasak, de farkúszója már jóvalta bíborosabb színű. Bajuszszálai eléggé hosszúak.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Haladó akvaristák megfelelő, különleges talajlakója lehet. Igazándiból nem kényes, viszont megfelelő oxigénellátás és erős, a vizet jól áramoltató szűrő nélkül aligha érzi jól magát. A túl meleg vizet sem

kedveli, hiszen egy gyorsan folyó patakokból származó csíkféléről beszélünk. Célszerű, ha vizének 25-35, esetleg 40%-át is rendszeresen (másfél-két hetente) cseréljük, így a kristálytisza és bomlástermékektől mentes vízben egészséges és hosszú életű halakra számíthatunk.

Kisebb csoportban, 3-5 egyed, tartandóak. Társíthatjuk bátran őket más talajlakókkal, csíkkalalakkal is, de például pontyfélékkel (díszmárnák, dániók, rasborák), esetleg gurámikkal szép társítást alakíthatunk ki.

Enyhén területvédők, kis helyen és búvóhelyek hiányában kell csak agresszióra számítanunk, de nem gyilkos hajlamú faj. Biztosítsunk nekik elég búvóhelyeket, kövekből nagyon szép barlangokat is összehozhatunk, amik igazán díszei is lehetnek medencénknek. Gyökerekkel, ágakkal is dekorálhatunk, mivel ezek szintén jó búvóhelyek. A növények megrágása sem jellemző a fajra, így akár egy sűrűbben beültetett medencébe is betelepíthetőek.

Úszónövényekkel az árnyékolást is megoldhatjuk, hiszen általában szürkületben mozgó halakról beszélünk. Etetés szempontjából sem kényesek, hiszen a jó minőségű, talajlakóknak szánt eledeleket szívesen fogadják, de érdemes kiegészítenünk ezt vörös szúnyoglárvával, tubifexszel, és más egyéb tápokkal, amit ezek a halak (más csíkokhoz hasonlóan) nagyon kedvelnek. Forrázott zöldségeket is kaphatnak. Hamar megérik a táplálék vízbe érkezését, és ha kedvükre való az eledel, mohón rá is vetik magukat.

Tenyésztésük sajnos akváriumi körülmények között mindmáig megoldatlan.

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: *Acanthocobitis rubidipinnis*, *Cobitis rubidipinnis*, *Nemacheilus rubidipinnis*, *Noemacheilus rubidipinnis*, *Nemachilus rubidipinnis*.

Eng: Cherryfin Zipper Loach.

Egyéb köznevei: Mřenka rangúnká, Punauim-ogatrull, Puumanuoliainen.

KATEGÓRIÁK:

[Akváriumi halak](#), [Csíkfélék](#)

KULCSSZAVAK:

[1860](#), [Blyth](#), [Csíkfélék](#), [Akváriumi halak](#), [Nemacheilidae](#), [akvarisztika](#), [Bíborfarkú kövicsík](#), [Paracanthocobitis rubidipinnis](#)

JELLEMZŐK:

[alsó szint](#), [mindenevő](#), [békés viselkedés](#), [átlagos élethossza 3-6 év](#), [igenlágvyvízi \(0-5°Nk\)](#), [lassú mozgású](#), [Myanmar](#), [lágvyvízi \(5-10 Nk°\)](#), [barna vízi](#), [növényt nem igényel](#), [közepes hőigényű \(20-25°C\)](#), [Ázsia](#), [bújós](#), [közepesen keményvízi \(10-15°Nk\)](#), [Dél-Ázsia](#), [közepesméretű akvárium \(50-100 literig\)](#), [gyors](#)

[vízáramlású](#), [fekete vízi](#), [közepes méretű 5-10 cm](#), [gyér növényzetigényű](#), [átlátszó vízi](#), [Indokína](#), [hőigényes \(25-30 °C\)](#), [közepesen áramló vízi](#), [India](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Írta: Liziczai Márk

Katalógusba került: 2012-12-16 09:01:17

Legutolsó frissítés: 2018-04-23 17:34:13

Katalógus ID: 4504

Oldal linkje: <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/csikfelek/paracanthocobitis-rubidipinnis.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva