

Parachromis dovii - Dovi-Sügér

ELSŐ LEÍRÓJA:	Günther, 1864
CSALÁD:	Cichlidae
MÉRET:	60-70 cm
C°:	24,0-28,0
pH°:	7,0-8,2
Nk°:	15,0-20
HELYIGÉNY:	850 ---- 2200 liter
VISELKEDÉS:	nem társas
TÁPLÁLÉK:	ragadozó, hlevő
TARTÓZKODIK?	középső- és alsó szint
ÉLETTARTAM:	8-12 év
TERM.VÉD.:	



Parachromis dovii
Dovi-Sügér
(Günther, 1864)

TOVÁBBI KÉPEK:



TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Parachromis dovii – Dovi-Sügér elterjedési területe (Map)

Nicaragua folyói és patakjai.

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

A hal ezüstösbarna testét egymástól egyenlő távolságra elhelyezkedő, vonalat alkotó sötét pontok fedik. Egy sötét, vízszintesen fekvő, töredezett foltok alkotta sáv fut a kopolyúfedőtől a farokig. A hímek hátúszója kihegyezett.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Mivel a hím dovii-sügeret nem véletlenül nevezik szörnyetegnek - valószínűleg az egyik legagresszívabb bölcsőszájú hal a világon - ezt a fajt ennek megfelelően, elkülönítve más halaktól kell tartani. Nem kezdőknek való faj. Ha magukban, párban tartjuk legalább 6-800 literes vagy annál nagyobb méretű akváriumra lesz szükség. Nagyon szívós halak, mindenféle víztípushoz gyorsan alkalmazkodnak. Területvédők és rendkívül agresszívek, csak akkor lehet más fajokkal együtt tartani, ha megfelelően nagy hely áll rendelkezésünkre, leginkább 2000 liter felett. Akváriumában legyen sok faág és sziklabarang rejtekhely gyanánt. Elsősorban hasonló habitusú fajokkal társítsuk ekkora óriás medencében, mint például a Cichlas ocellarissal, monoculussal!

A Dovii mindenevő, táplálékát extra nagy pellet, férgek, szúnyoglarva, tubifex, húskészítmények, rovarok, krill, valamint, mert erre méretei miatt szüksége van: (arany)hal képezzék. Ha aranyhallal etetjük, vegyük figyelembe halunk méreteit és kötelezően használjunk külön karantén-tartályt a betegségek terjedésének megakadályozására.

A Doviit ne próbáljuk meg tenyészteni, ha nincs elegendő hely az ikrázáshoz, és az elúszott ivadék megfelelő mozgásához. A szaporodási folyamat időnként nagyon durva. A halaknak gyakran órákig szájára lesz, és ha valamelyik riválisa ilyenkor megtámadja, akkor rendszerint meg is öli. A test villogtatásával és a kopolyúkkal próbálják dominanciájukat érvényesíteni. Az általuk lerakott 500-1000 ikra 3 nap múlva kel ki. Az első héten az ivadékok általában már szabadon úsznak. Ezen a ponton a legjobb, ha megpróbáljuk eltávolítani az ivadékot és átköltöztetni őket egy másik tartályba. A hím ugyanis nagyon agresszív lesz, ha az ivadék a közelében marad.

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: *Cichlasoma dovii*, *Herichthys dovii*, *Heros dovii*.

Eng: Dovii, Guapote, Wolf Cichlid, Rainbow bass.

Egyéb köznevei: Guapote-cichlide, Leopardkirjoahven, Leopardenbuntbarsch, Guapote, Guapote blanco, Lagunero.

KATEGÓRIÁK:

[Amerikai fajok](#), [Akváriumi halak](#), [Bölcsőszájú halak](#)

KULCSSZAVAK:

[Amerikai bölcsőszájúhalak](#), [Dovi-Sügér](#), [Parachromis dovii](#), [Akváriumi halak](#), [Günther](#), [akvarisztika](#), [1864](#), [Cichlidae](#)

JELLEMZŐK:

[közepesen áramló vízi](#), [közepesen aktív mozgású](#), [középső szint](#), [keményvízi 15-20°Nk](#), [nagy \(több 200 liternél\)](#), [ragadozó](#), [féléves \(7.5-8 pH\)](#), [hőigényes \(25-30 °C\)](#), [hosszú életű 6 év fölött](#), [normál \(6.5-7.5 pH\)](#), [Amerika](#), [gyér növényzetigényű](#), [lúgos \(8pH-nál több\)](#), [Közép-Amerika](#), [óriás méretű 20 cm fölött](#),

[alsó szint](#), [trópusi](#), [összeférhetetlen viselkedés](#), [átlátszó vízi](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Írta: Honffy Gábor

Katalógusba került: 2008-05-14 09:01:16

Legutolsó frissítés: 2013-09-27 06:14:05

Katalógus ID: 4218

Oldal linkje: https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/bolcsoszaju_halak/amerikai-fajok/parachromis-dovii.html

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva